

NAGYKANIZSA IDŐJÁRÁSÁNAK TÖRTÉNETE

1873 – 2018

Írta az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján

Varga Géza

Előszó

2010-ben az Országos Meteorológiai Szolgálat dolgozójaként lehetőséget kaptam régi, 1800-as évekre visszanyúló meteorológiai adatok számítógépes feldolgozására. Elsőként Nagykanizsa klímaíveit kaptam meg. Adva volt a lehetőség, hogy kijegyzeteljem az érdekesebb adatokat, majd két év múltán, csupán saját célra, elkezdtem éves bontásban legépelni azokat. 2014 év vége táján egy utazásom alkalmával megemlítettem ezt Tarnóczky Attilának, volt tanáromnak, aki miután meglátta az addigi munkámat, felajánlotta segítségét annak megjelenéséhez. Később többször beszéltem erről Czupi Gyulával, a Halis István könyvtár igazgatójával, aki felvázolt pár időjárással kapcsolatos eseménysort, amit be lehetne még írni a tanulmányba – pld. villámlás okozta tűzvész –, de mivel a klímaíveken csak meteorológiai adatok szerepelnek – kivéve az első időszak földrengéseit –, szűkre szabott időm hiányában ezek elmaradtak. Céлом a történeti visszatekintés mellett az időjárás változatosságának, sokszínűségének bemutatása volt, melyből messzemenő következtetések, mint pld. a klímaváltozás is kiolvasható.

Köszönetemet fejezem ki Dr. Radics Kornéliának, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnökének, aki örömmel fogadta a téma iránti érdeklődésemet és nem szabott gátat az adatok felhasználása miatt, Tarnóczky Attilának és Czupi Gyulának, akik lelkesen segítettek írásom megjelenését, valamint Tábori Imrének és fiamnak, Varga Károlynak, akik a formai megjelenítéshez nyújtottak segítséget.

Bevezetés

Magyarországon 1781. november elsejétől végeztek rendszeres meteorológiai észleléseket a Budai Egyetem csillagdjában, a várban, majd később, 1853-tól már 14 megfigyelő állomásról küldtek jelentést Osztrák-Magyar Monarchiai központba. 1870. április 8-án Eötvös József kultuszminiszter jóváhagyta az Országos Meteorológiai és Földmágnességügyi Intézet megalakulását, mely 1870. május 5-től kezdte el működését. 1871-től 11 állomás küldött naponta jelentést napi három észlelésről.

Nagykanizsán Éghajlatkutató Állomás néven 1873. januártól kezdődtek a meteorológiai észlelések napi 3 hőmérséklet- és légnyomásméréssel, valamint csapadékméréssel, szél- és felhőmegfigyeléssel, amit német és magyar nyelvű klímaíveken rögzítettek. Maximum- és minimum-hőmérsékletet 1937 augusztusától mértek, az automata mérőeszközök rendszerbeállítása pedig 1996 áprilisától kezdődött. Az állomás 1951 márciusától Szinoptikus Főállomás, a WMO (Meteorológiai Világszervezet) kiemelt állomása lett. 2007. április 1-től az állomás dolgozóit a sármelléki repülőtérre helyezték. Azóta csak automata adatok állnak rendelkezésre.

Az 1873 – 2015-öt felölelő időszak adatsorában átlagtól eltérő, rendkívüli időjárási események szerepelnek, ezért viszonyítási alapként felsorolok néhány 1909-től számított átlagos adatot.

Nagykanizsán az évi középhőmérséklet 10,1 °C.

A nyári hónapok átlaghőmérséklete 19,4 °C.

A téli hónapok átlaghőmérséklete 0,3 °C.

Az éves csapadékmennyiség átlaga 749,4 mm.

A havi átlagcsapadék 62,5 mm.

A legcsapadékosabb hónapok sorrendben: június, július és május.

A legszárazabb hónapok sorrendben: február, január és március.

Ezen kívül még felsorolok néhány meteorológiai meghatározást.

Nyári napok: a maximum-hőmérséklet ≥ 25 °C

Hőség napok: a maximum-hőmérséklet ≥ 30 °C

Forró napok: a maximum-hőmérséklet ≥ 35 °C

Téli napok: a maximum-hőmérséklet ≤ 0 °C

Hideg napok: a minimum-hőmérséklet ≤ -5 °C

Zord napok: a minimum-hőmérséklet ≤ -10 °C

Hivatkozással az alábbi szövegrészre kattintva a következő adatok érhetők el:

- [A legmelegebb év.](#)
- [A leghűvösebb év.](#)
- [A legmelegebb hónap.](#)
- [A leghidegebb hónap.](#)
- [A legmelegebb nap.](#)
- [A leghidegebb nap.](#)
- [A legmagasabb hőmérséklet.](#)
- [A legalacsonyabb hőmérséklet.](#)
- [A legmelegebb nyár–2.](#)
- [A leghidegebb tél.](#)
- [A legtöbb nyári nap.](#)
- [A legtöbb hőségnap.](#)
- [A legtöbb forró nap.](#)
- [A legtöbb hideg nap.](#)
- [A legtöbb zord nap.](#)
-
- [A legcsapadékosabb év.](#)
- [A legszárazabb év.](#)
- [A legcsapadékosabb hónap.](#)
- [A legszárazabb hónap.](#)
- [A legcsapadékosabb nap.](#)
- [A legtöbb évi csapadékos nap.](#)
- [A legtöbb havi csapadékos nap.](#)
- [A legnagyobb átlagos hóvastagság.](#)
- [A legtöbb évi havas nap.](#)
- [A legtöbb havi havas nap.](#)
- [A legtöbb hótakarós nap.](#)
- [A legtöbb évi zivataros nap.](#)
- [A legtöbb havi zivataros nap–2.](#)
- [A legtöbb évi jégesős nap.](#)
- [A legtöbb havi jégesős nap–2–3.](#)

Hűvös év. A meleg decembert nagyon hideg január követte $-5,1$ °C-os átlaggal. A havas napok egészen ápriliséig tartottak és már októberben, valamint novemberben is havazott. Május, ill. június zivataros napjainak száma 7, október pedig rendkívül csapadékos volt $189,9$ mm-rel.

1882. 10,3 °C 867,3 mm

Áprilistól novemberig 27 zivataros napot jegyeztek fel. A hűvös nyár átlaghőmérséklete $18,3$ °C volt és a csapadék nagy része ($494,3$ mm) júliustól októberig esett le.

1883. 9,0 °C 770,7 mm

Júniusban 7, júliusban 9 zivataros napot rögzítettek. A legtöbb csapadék június 18-án hullott, $56,7$ mm, a legcsapadékosabb hónap pedig július volt $136,3$ mm-rel.

1884. 9,6 °C 813,9 mm

Csapadékos nyár ($348,3$ mm), hűvös június ($15,7$ °C) és havas november (7 nap havazott) az év jellemzője. Június 8-án $50,6$ mm, július 10-én $45,5$ mm, augusztus 27-, 28-án pedig $86,3$ mm csapadékot mértek.

1885 – 1890. Csak egy-egy hónap részleges adata van meg.

1887. (hiányos)

Az első negyedév hideg és száraz volt $-1,0$ °C-os átlaggal és $10,1$ mm csapadékkal.

Január: $-4,2$ °C $0,7$ mm

Február: $-2,3$ °C $1,3$ mm

Március: $3,4$ °C $8,1$ mm

1891. 9,0 °C 682,3 mm

Mivel 1890. év adatai hiányoznak, ezért Kaposvár decemberi adatait vettem alapul, így a három téli hónap átlaghőmérséklete kb. $-5,3$ °C-ra tehető, ami rendkívül hideg. Január átlaga $-7,9$ °C, februáré $-4,1$ °C. Januárban 9 nap -10 °C alatt maradt az átlaghőmérséklet és két hózivatar is volt.

1892. 9,2 °C 781,0 mm

Júliusban $116,1$ mm eső-záporosó esett, az augusztus 2-i zivatarból pedig $56,2$ mm. A hűvös novembert ($1,9$ °C) hideg tél követte. December átlaga $-2,6$ °C.

1893. 9,0 °C 755,9 mm

Az 1892–93-as tél átlaghőmérséklete $-3,3$ °C. A rendkívül hideg januárban ($-8,6$ °C) 9 nap volt -10 °C alatti átlaghőmérséklet és 13 nap esett a hó. A csapadékos hónapok: június $149,2$ mm-rel, július $113,3$ mm-rel és 9 zivataros nappal, valamint november $145,2$ mm-rel.

1894. (hiányos) Csak az első hét hónap adatai vannak meg.

Hideg január (-4,0 °C) és forró július (22,5 °C) jellemezte az évet. Júliusban 28 nap volt 20 °C feletti átlaghőmérséklet.

1894. augusztustól 1899. júliusig az adatok hiányoznak.

1899. augusztustól 1908. szeptemberig csak csapadékadatok vannak.

1899. (hiányos)

Szeptemberben 110,9 mm eső esett. December 10-től a hónap végéig hó borította a tájat, melynek vastagsága 14-én 43 cm volt.

1900. 861,7 mm

Mindössze a július 6-i 42,9 mm csapadék és a száraz szeptember (10,4 mm) érdemel említést.

1901. (hiányos)

Május, június és július zivatarral tarkított 24 zivataros nappal. Augusztus 2-án 62,8 mm, november 15-én pedig 46,7 mm eső-záporos esett.

1902. 981,3 mm

Csapadékos év. Május, június és július csapadékösszege 420,6 mm, októberé pedig 150,2 mm. Július 2-án jégeső volt 37,5 mm csapadékkal, ill. decemberben 25 nap borította hó a talajt.

1903. 1222,2 mm

A legcsapadékosabb év, januárban 18 hótakarós nappal. Áprilisban 203 mm, júliusban 149,8 mm, szeptembertől év végéig pedig 529,5 mm csapadék hullott, melyből a legtöbb decemberben, 162,5 mm.

1904. 965,4 mm

Csapadékos év. Februárban rendhagyóan 11 zivatar volt és valószínű, hogy meleg is (következtetés). Február, március, május és augusztus volt csapadékos, július viszont száraz 1,5 mm-rel. Március 31-én 46,7 mm záporos esett.

1905. 1031,9 mm

Erősen csapadékos év. Májusban 138,8 mm, az őszi hónapokban pedig 546,3 mm csapadék hullott, melyből a novemberi 210 mm-es mennyiség emelkedik ki. A legnagyobb napi mennyiség, 59,3 mm záporos, a szeptember 27-i zivatarból esett.

1906.

1045,8 mm

Az előző évhez hasonlóan, szintén sok volt a csapadék. Január 7-én 49,1 mm eső esett, majd a havazások folytán 26-án 49 cm átlagos hóvastagságot mértek. Februárban 27 hótakarós, májusban pedig 11 zivataros nap volt. Május, június és július hónapban 376,3 mm volt a csapadékmennyiség. A legcsapadékosabb napokon, június 6-án 43,9 mm és július 10-én 47,3 mm záporosó, eső esett. December 17-től január 12-ig hó borította a talajt, melynek vastagsága december 30-án 69 cm volt.

1907. (hiányos)

A legnagyobb hóvastagságot január 1-jén mérték, 64 cm-t. Folytonos, összefüggő hótakaró január 21-től március 3-ig volt. Áprilisban 198, júliusban pedig 148,3 mm csapadék hullott.

1908. (hiányos)

Augusztusban, a legcsapadékosabb hónapban 125,3 mm csapadékösszeget mértek. A legtöbbet, 56,3 mm-t, a 15-i zivatarból.

1909.

9,7 °C

613,7 mm

1908–1909 tele hideg, átlaghőmérséklete -2,6 °C volt. Augusztusban 8 zivataros napot jegyeztek fel, aztán egy nagyon enyhe tél következett.

1910.

10,7 °C

859,3 mm

Az 1909–10-es enyhe tél átlaghőmérséklete 3,2 °C. Májustól augusztusig 31 zivataros nap volt. A június 7-i jégesős zivatarból 52,2 mm csapadék hullott. A legcsapadékosabb hónapok június és november 153, ill. 110,4 mm-rel. December hónap szinte melegnek mondható az 5 °C-os átlagával.

1911.

10,7 °C

657,3 mm

Májusban 19 nap esett az eső-záporosó, összesen 199,4 mm és 6 zivataros nap volt, augusztusban pedig 7. A legcsapadékosabb nap október elseje 44,9 mm-rel.

1912.

9,6 °C

780,2 mm

Az év érdekessége mindössze a február 6-i 36 cm-es hóvastagság és a márciusi 19 csapadékos nap 100,2 mm-rel.

1913.

10,0 °C

696,8 mm

Januárban 16 nap takarta hó a talajt. Júliusban 19 nap alatt 172,6 mm csapadék hullott 8 zivataros nappal és a hónap átlaghőmérséklete csak 17 °C volt. A nyár szintén hűvös volt 17,8°-os átlaggal.

1914.

9,2 °C

810,4 mm

Kissé hűvös év. Január és február nagyon hideg volt -5,6, ill. -2,2 °C-os átlaghőmérséklettel. Egész januárban és februárból 22 napon át borította hó a talajt. Májusban 145,8 mm, júliusban 143,7 mm, szeptemberben pedig 125,8 mm eső-záporosó esett, valamint júniusban három jégeső tizedelte a termést.

1915. 10,1 °C 1089,8 mm

Az 1914–15-ös tél enyhe (2,7 °C), az év pedig csapadékos volt. Májustól augusztusig 498,5 mm eső esett. Májusban 142,4, júliusban 161,3 mm. Május 20-, 21-én 99,2 mm – ebből 20-án 67 mm –, június 29-én pedig 40,5 mm csapadék hullott. Az év vége szintén enyhe volt december 6 °C-os átlagával.

1916. 11,6 °C 828,9 mm

Az 1915–16-os tél még enyhébb volt az előzőnél. Átlaghőmérséklete 3,5 °C és december még ennél is enyhébb, 4,9 °C. Az átlagosnál jóval melegebb évben mindössze 4 hótakarós nap volt. Jelentős csapadék áprilisban és szeptemberben hullott (125, ill. 107,6 mm), júniusban pedig 7 zivataros napot jegyeztek fel.

1917. 10,3 °C 624,0 mm

A hideg februárt (-4,9 °C) száraz május (mindössze 1 csapadékos nappal, 7,5 mm-rel) és a feldolgozott időszak legmelegebb nyara (22,1 °C) követte 72 20 °C feletti és 11 25 °C feletti átlaghőmérsékletű nappal. Január 19-től február 27-ig, majd decemberben is 20 napon át borította hó a talajt. Február 4-én 44 cm, december 28-án pedig 48 cm volt a hó vastagsága. Nyáron 14 zivataros napot jegyeztek fel, mégis a legtöbb csapadék októberben esett, 116,8 mm.

1918. 10,8 °C 763,7 mm

Az évet csapadékos nyár jellemezte. Júliusban 177,9, augusztusban pedig 114,5 mm eső-záporos esett. A július 27-i jégesős zivatar csapadékmennyisége 64,5 mm volt.

1919. 10,0 °C 910,5 mm

Februárban 18 hótakarós napot rögzítettek. Áprilisban 102, júliusban 132 és novemberben 117,9 mm csapadékot mértek. Az év 7 jégesős napjának, melyből 4 májusra esett (havi rekordmennyiség), bizonyára nem örültek a gazdák és valószínű a 8 júliusi zivataros napnak sem.

1920. 11,0 °C 692,6 mm

November kivételével (1 °C) az átlagosnál melegebbek voltak a hónapok. Január és február hó nélkül telt el. A nyarat zivatarral tarkított, csapadékos napok jellemezték. Júniusban 7, júliusban 6 zivataros napot jegyeztek fel. A június 14-i jégesős zivatarból 44 mm csapadék hullott, a havi csapadékösszeg pedig 154,1 mm volt.

1921. 11,0 °C 482,6 mm

A meleg, rendkívül száraz év nagyon enyhe januárral kezdődött (4,1 °C). Márciusban csak 4,3 mm eső esett. Május volt a legcsapadékosabb hónap 92,7 mm-rel, ill. 8 zivataros nappal, július pedig forró 23 °C-os átlaggal. Az nyár folyamán 20 nap 25 °C és 10 nap 27 °C felett volt az átlaghőmérséklet. Október 23-án 38,7 mm eső esett. Novemberben 9, decemberben 24 nap fedte hó a talajt.

1922. 10,1 °C 840,5 mm

Januárban 14 nap havazott. A hótakarós napok száma januárban 19, februárban 16 volt. Áprilisban hullott a legtöbb csapadék (153,4 mm) 19-én 49,5 mm esővel. Szeptemberben 131,6 mm volt a csapadékmennyiség 6 zivataros nappal, októberben pedig 150,1 mm.

1923. 10,8 °C 855,5 mm

Június nagyon hűvös és esős volt 15,7 °C-os átlaggal és 136 mm csapadékkal. Az év legcsapadékosabb napján, az október 4-i zivatarból 36,7 mm záporosó esett. Novemberben 110,1 mm volt a havi csapadékösszeg.

1924. 9,6 °C 709,0 mm

Januárban 29, februárban 24 és márciusban 14 hótakarós nap volt. Februárban 14-szer havazott. Májusban 160,6 mm csapadék hullott 8 zivatarral, augusztusban 103,7 mm, de novemberben csak 4,1 mm.

1925. 10,2 °C 927,1 mm

Február meleg volt 5,1 °C-os átlaggal, március viszont hűvös 4,1 °C-kal. Májusban 108,8, júniusban 138,6, szeptemberben 117,2 és novemberben 143,1 mm csapadék hullott. Júliusban 8, augusztusban pedig 7 zivatart jegyeztek fel. Május 2-án 36,4 mm eső, a június 18-i zivatarból pedig 41,3 mm záporosó esett. Decemberben 21 hótakarós nap volt.

1926. 10,7 °C 904,2 mm

Nagyon enyhe február (5,5 °C), november (10,9 °C) és hűvös nyár (18,0 °C) jellemezte az évet. Március hűvösebb volt februárnál és október novembernél. Januárban 20 napon át fedte hó a talajt. Május, június és július csapadékösszege 415,5 mm volt. Az év 40 zivataros napjából májusban 9-et, júniusban 8-at, júliusban pedig 10-et jegyeztek fel.

1927. 10,6 °C 641,1 mm

A legcsapadékosabb hónapban, augusztusban 122,2 mm, a legcsapadékosabb napon, az augusztus 16-i zivatarból pedig 35,4 mm záporosó esett. December hideg volt -2.4 °C-os átlaggal és 20 hótakarós nappal.

1928. 10,3 °C 759,8 mm

Márciusban 8 nap havazott. A legcsapadékosabb hónapok május és szeptember 152,5, ill. 135,7 mm-rel. A május 8-i zivatarból 43,4 mm, a 19-i esőből 34 mm, valamint a szeptember 16-i zivatarból és a másnap lehullott esőből pedig 66 mm csapadékot mértek.

1929. 9,1 °C 769,8 mm

A 85 hótakarós napjával második helyen álló év rendkívül hideg januárral (-5,3 °C) és februárral (-8,9 °C) kezdődött. Februárban 13 nap -10 °C alatt, 6 nap pedig -15 °C alatt maradt az átlaghőmérséklet, aztán száraz március következett. Mindössze 27-én esett 1,4 mm eső, de a talaj kiszáradását az év elejétől március 14-ig tartó hótakaró meggátolta. A hó vastagsága február 16-án 59 cm, március 3-án pedig 28 cm volt. A legcsapadékosabb hónap június 123,3 mm-rel.

1930. 11.1 °C 902,3 mm

Az átlagosnál melegebb és csapadékosabb év magasabb hőmérsékletének havi eloszlása viszonylag egyenletes volt. A legtöbb csapadékot szeptemberben (124,4 mm), októberben (181,9 mm) és decemberben (112,6 mm) mérték. Október 23-tól 25-ig 81,2 mm, a legcsapadékosabb napon, november 4-én pedig 44,3 mm eső esett.

1931. 9.6 °C 730,0 mm

Februárban 120,1 mm csapadék hullott nagyrészt hó formájában. Február 6-tól március 17-ig fedte hótakaró a talajt. Február 17-én 46 cm, március 12-én pedig 24 cm volt a hó vastagsága.

1932. 10,0 °C 605,9 mm

Hideg volt a február és a március is -3,9, ill. 0,4 °C átlaghőmérséklettel. Márciusban 10 nap havazott. Február 10-től március 17-ig borította hó a talajt, melynek vastagsága március 11-én 32 cm volt. A legcsapadékosabb hónap október 132,5 mm-rel.

1933. 9.2 °C 910,1 mm

Hideg januárral kezdődött (-2,5 °C) és decemberrel (-4,2 °C) fejeződött be az év. Januárban 21, februárban 12 és decemberben 30 hótakarós nap volt. December 23-án 46 cm hóvastagságot mértek. A legcsapadékosabb hónapok: május (100,9 mm), október (112,1 mm), november (172,5 mm) és december (101,8 mm). Az augusztus 22-i zivatarból 52,5 mm záporosó, november 13-án pedig 47,2 mm eső esett. Júniusban 8 zivataros nap volt.

1934. 11,4 °C 636,7 mm

Az előző év decemberétől február 16-ig fedte a talajt hótakaró. Az átlagosnál jóval melegebb évben március (8,7 °C), április (13,7 °C) és a nagyon enyhe december (5,6 °C) hőmérséklete emelkedett ki leginkább. Júniusban 139,1 mm csapadék hullott. Október 15-én 39,2 mm eső esett. Júniusban 8, júliusban pedig 7 zivataros nap volt.

1935. 10,1 °C 641,9 mm

-2,8 °C-os, hideg januárral kezdődött az év. A hótakarós napok száma januárban 21, februárban 12, decemberben pedig 19 volt. Májusban 8 zivataros napot jegyeztek fel. Decemberben hullott a legtöbb csapadék, 114,8 mm és 10 nap havazott.

1936. 10,8 °C 929,0 mm

1935–36. enyhe telének átlaghőmérséklete 3,2 °C, melyből a nagyon enyhe januáré 5,2 °C volt. Februárban 95,3 mm, májusban 172,4 mm, szeptemberben 107,3 mm és októberben 136,7 mm csapadék hullott. Az év 36 zivataros napjából májusban volt a legtöbb, 10, a 7 jégesős napból pedig májusban és júniusban is 3-3. A május 27-i jégesős zivatar 52,9 mm, a június 30-i 66,2 mm, valamint a szeptember 26-, 27-i eső 54 mm csapadékot eredményezett.

1937. 10,7 °C 1143,5 mm

Hideg januárral kezdődött (-2,5 °C) a rendkívül csapadékos év. A csapadékos napok számával, 169-cel, a feldolgozott időszak első helyén áll, ahogy az évi 8, valamint az áprilisi 4 jégesős nappal is. Márciusban 158,7, áprilisban 119,5, júliusban 131,2, augusztusban 110, szeptemberben 110,7, novemberben 120,8 és decemberben 137,7 mm csapadék hullott. A legtöbb július 25-én, 42 mm. Az év 31 zivataros napjából 8-at júliusban jegyeztek fel.

1938. 10,3 °C 705,7 mm

Február száraz volt 5,3, május és augusztus viszont csapadékos 105,1, ill. 149,5 mm-rel. A legtöbb csapadék, 50 mm, a szeptember 15-i jégesős zivatarból hullott. Az év 33 zivataros napjából júniusban 6-ot, júliusban 7-et és augusztusban 8-at rögzítettek.

1939. 10,6 °C 762,9 mm

Az első negyedév enyhe volt 2,8 °C-os átlaggal. Májusban 6 zivatart és rendkívül sok, 213,1 mm csapadékot jegyeztek fel. Október szintén csapadékos volt 124,2 mm-rel. A legnagyobb napi mennyiséget, 57,6 mm-t, a június 14-i zivatarból mérték.

1940. 8,1 °C 1215,1 mm

Az év mind a hideg napokat (78), mind a zord napokat (46), valamint a hótakarós napokat (99) tekintve vezető helyen áll. Átlaghőmérséklete rendkívül alacsony – a nyári hónapoké is csak 18 °C-, csapadékmennyisége és a zivataros napok száma (37) viszont nagyon magas volt. 1939–40 telének átlaghőmérséklete -4,6 °C. Januáré -8,2, februáré és az év végén decemberé is -5,1 °C. Januárban az átlag 12 nap maradt -10 °C alatt. A leghidegebb, -21,2 °C, február 15-én volt. Januárban 16, februárban és decemberben 9 nap havazott. Január 4-től március 24-ig és decemberben 26 napon át takarta hó a talajt. A hó vastagsága január 28-án 46 cm, február 14-től 19-ig 45 cm és december 25-, 26-án 30 cm volt. A legtöbb csapadék májusban (22 nap alatt 135,9 mm), júliusban (163,0 mm), augusztusban (210,0 mm), szeptemberben (192,1 mm) és októberben (101,8 mm) hullott. A legcsapadékosabb napok: a július 16-i és az augusztus 12-i zivatar 71,5, ill. 60 mm-rel, valamint az augusztus 22-i és a szeptember 15-i eső 66,7 és 48,4 mm-rel. Májusban 8, júniusban és júliusban 7, augusztusban pedig 6 zivataros napot jegyeztek fel.

1941. 9,2 °C 843,1 mm

Az 1940–41. telének átlaghőmérséklete -2,0 °C. Januárban 25 és februárban 14 hótakarós nap volt. A legcsapadékosabb hónapok: április 115,3 és november 104,9 mm-rel. Júliusban 8 zivataros napot rögzítettek. November 5-én 40 mm eső esett.

1942. 9,4 °C 779,5 mm

Rendkívüli hideggel és hó mennyiséggel kezdődött az év. 1942 tartja a leghidegebb nap, a legalacsonyabb hőmérséklet és a hótakaró vastagságának rekordját. Január átlaghőmérséklete -8,6 °C, februáré -3,8 °C, a téli hónapoké pedig -4,1 °C volt. Januárban 12 nap mértek -10 °C alatti átlaghőmérsékletet, 23-án a rekordértéket, -19,5 °C-ot. A legalacsonyabb hőmérsékletek: január 23-án -24,8 °C, 24-én a helyi abszolút minimum, -27,4 °C, 28-án -22,0 °C és február 13-án -19,0 °C. Januárban 11, februárban 13 és márciusban 7 nap havazott. Az előző év december 20-tól március 20-ig tartó hótakaró átlagos vastagsága január végén 37 cm-t, február 17-én pedig a feldolgozott időszak legmagasabb értékét, 122 cm-t ért el. A legcsapadékosabb hónap február volt 108 mm-rel. Májusban 7 és júliusban 10 zivataros napot jegyeztek fel.

1943. 10,6 °C 809,5 mm

Az évet hideg január (-4,4 °C), enyhe február (3,4 °C), valamint forró augusztus (21,7 °C) jellemezte. Augusztusban 23 nap haladta meg a 20 °C-ot az átlaghőmérséklet és 21-, 22-én 37,5 °C maximumot mértek. A hótakaró az előző év december 25-től február 8-ig borította a talajt. Januárban 12 nap havazott és 17-én 45 cm volt a hó vastagsága. Júniusban 20 nap alatt 190,5 mm, novemberben pedig 153,6 mm csapadék hullott. A június 3-i zivatarból 59 mm záporosó esett. Júliusban 8 és augusztusban 7 zivataros napot rögzítettek.

1944. 10,2 °C 872,8 mm

Februárban 13, márciusban pedig 17 nap havazott. Február 11-től március 22-ig hóborította tájra ébredtek az emberek. A legnagyobb hóvastagságot március 7-én mérték, 30 cm-t. Június zivataros napjainak száma 7, augusztus pedig forró volt – átlaghőmérséklete 22,3 °C –, majd egy csapadékos ősz következett. Októberben 159,9 mm, novemberben pedig 119,4 mm eső esett.

1945. 10,7 °C 573,6 mm

Január átlaghőmérséklete -4,2 °C és 14 nap havazott. A hótakaró 1944. december 24-től február 9-ig tartott, melynek vastagsága január 28-án 40 cm-t ért el. A legalacsonyabb hőmérsékletet január 22-én mérték, -19 °C-ot, május 13-án pedig rendkívüli meleget, 32 °C-ot. Június 8-án 33,5 °C, július 27-én 35 °C és augusztus 31-én 34,5 °C volt a maximum-hőmérséklet. A legtöbb csapadék november 9-én hullott, 45,7 mm, egyébként az év száraznak mondható.

1946. 11,2 °C 532 mm

Nagyon meleg és száraz év rekord mennyiségű, 117 nyári nappal, 43 hőségnappal és 7 forró nappal. A nyár átlaghőmérséklete 21,5 °C volt. Júliusban 15 nap 30 °C, vagy annál magasabb, augusztusban 18 nap 30 °C, 5 nap pedig 35 °C, vagy afeletti maximum-hőmérsékletet mértek. Július 28-án 35 °C, augusztus 18-án pedig 37,8 °C volt a legmagasabb érték. Januárban 10 nap havazott és 19 nap volt hótakarós. Áprilisban mindössze egy nap, 4-én esett az eső, 4 mm. Májusban 7 zivatar volt. A legtöbb csapadék a július 7-i zivatarból hullott, 61,2 mm, a legcsapadékosabb hónap pedig október 90,9 mm-rel.

1947. 10,7 °C 623,7 mm

Szélsőséges év hideg téllal (-3,3 °C), meleg nyárral (20,9 °C) és 114 nyári nappal. Január átlaghőmérséklete -6 °C volt annak ellenére, hogy 16-án 8 °C-os maximumot mértek, viszont 31-én már -21 °C volt a minimum-hőmérséklet. A legmelegebb nap augusztus 5-e 36 °C-os maximummal. Januárban 13, februárban 17 nap havazott. Januártól március 8-ig takarta hó a talajt. A legnagyobb hóvastagságot, 50 cm-t február 20-án mérték. Február rendkívül csapadékos 152,1 mm-rel, augusztus pedig száraz 4,8 mm-rel. A zivataros napok száma júniusban 7, júliusban pedig 8 volt.

1948. 10,7 °C 912,8 mm

Az évet enyhe január (4,6 °C) és csapadékos nyár (405,3 mm) jellemezte. Júniusban 142,1 mm, júliusban pedig 191,9 mm volt a csapadékmennyiség. Július 5-től 10-ig 156,3 mm, ebből 6-án 70,6 mm eső-záporosó esett. Februárban 11 nap havazott és májusban 10 zivataros nap volt.

1949. 10,9 °C 523,8 mm

A száraz év első három hónapjában összesen 15,7 mm csapadék hullott. A feldolgozott időszak legszárazabb havában, februárban csak egy nap esett az eső (0,2 mm), ahogy szeptemberben is (0,6 mm), viszont novemberben 21 nap alatt 125,1 mm csapadékmennyiséggel. 31 zivataros nap volt az év folyamán, ebből májusban 12, júniusban pedig 10. Egész évben csak két napot fedett hótakaró, egyet januárban és egyet februárban.

1950. 11,0 °C 975,3 mm

A meleg, csapadékos év hideg és csapadékos januárral kezdődött (-4,1 °C, ill. 126,1 mm). 31-én -21,5 °C volt a minimum-hőmérséklet. 15 nap havazott és hó borította a tájat január 11-től február 12-ig, melynek vastagsága január 29-én és 30-án elérte az 50 cm-t. Aztán májustól egy forró időszak következett 97 nyári nappal, valamint a feldolgozott időszak legmelegebb napjaival. Július 4-én és 5-én 29,4°C-os átlaghőmérsékletet mértek. Májusban 3 nap volt 30 °C feletti hőmérséklet. A nyári hónapok átlaga 21,6 °C, 12 nap 25 °C feletti és 6 nap 27 °C, vagy afeletti átlaghőmérséklettel. Június 30-án 37 °C-ot, július 5-én 38,5 °C-ot, augusztus 26-án pedig 36,9 °C-ot mutatott a hőmérő. Júliusban 7, augusztusban 6 nap volt 35 °C közeli, vagy afeletti maximum-hőmérséklet. Csapadékos hónapok: január (126,1 mm), július (121,8 mm), szeptember (146,4 mm), október (103,1mm), november (116,6 mm) és december (105,4 mm). A július 15-i zivatarból 50 mm, a szeptember 16-iból pedig 70 mm csapadék hullott. Augusztusban 7 zivataros és 2 jégesős napot rögzítettek.

1951. 11,3 °C 854,4 mm

Az egyik legmelegebb év. Az 1950–51-es tél átlaghőmérséklete 3,2 °C. Február és november hőmérséklete emelkedett ki leginkább 4,9 °C-os, ill. 8,2 °C-os átlaggal. November 12-én 20,8 °C-ot mértek. Mindössze egy hótakarós napot jegyeztek fel, március 3-át, 1 cm összefüggő hóréteggel. A legcsapadékosabb hónap május (127,3 mm) és június (169,4 mm), a legszárazabb pedig október (2,9mm) volt. A legtöbb csapadék június 6-án esett, 72,6 mm.

1952. 9,8 °C 765,8 mm

Havas tél és forró nyár jellemezte az évet. Januárban 12, februárban 11, márciusban 6 és decemberben 12 nap havazott. Január 19-től február 28-ig volt összefüggő hótakaró. Február 19-én 35 cm hóvastagságot mértek. Március átlaghőmérséklete 3,3 °C, hűvös, viszont július és augusztus forró napokban bővelkedett. Júliusban 15 nap, augusztusban pedig 18 nap volt magasabb, vagy egyenlő a hőmérséklet, mint 30 °C. Augusztus 14-én 36,4 °C, 15-én pedig 36,2 °C volt a maximum. A legcsapadékosabb hónapok: június (104,8 mm), szeptember (102,2 mm), október (107,3 mm) és december (118,1 mm). A június 16-i zivatarból 57,1 mm jégeső-záporosó esett.

1953. 9,7 °C 581,1 mm

A száraz évben az első negyedév (összesen 31 mm) és november (8,9 mm) volt a legszárazabb, viszont májusban és júniusban sok csapadék hullott, 177,5, ill. 102,4 mm. Május 27-, 28-án 88,2 mm, a június 12-i zivatarból pedig 45,4 mm záporosó esett. Júniusban 11 és júliusban 9 zivataros napot rögzítettek.

1954. 8,8 °C 731,5 mm

A 31 zord napot számláló hűvös év hideg téllal kezdődött. 1953–54. telének átlaghőmérséklete -4,2 °C, januáré -6,2 °C, februáré pedig -6,3 °C volt. Januárban 9 és februárban szintén 9 nap volt -10 °C-nál alacsonyabb az átlag. Január 28-án -20,4 °C-ot, február 22-én -20,7 °C-ot mértek. Januárban 22, februárban 12 nap havazott és mindkét hónapot hótakaró fedte. A legnagyobb hóvastagságot január 13-án és 15-én mérték, 29 cm-t. Az év legmelegebb napja augusztus 22-e, 32,6 °C-kal. Legcsapadékosabb hónapok: május 100,1 és július 135,4 mm-rel. Az év legcsapadékosabb napján, a július 7-i zivatarból 45,3 mm záporosó esett. Júniusban 10, júliusban és augusztusban pedig 6 zivataros napot jegyeztek fel.

1955. 9,1 °C 853,7 mm

Március kemény téllal kezdődött, 4-én -21,1 °C-kal. 13 nap havazott, 19 nap volt hótakaró, melynek vastagsága 7-én 49 cm-t ért el. A hónap átlaghőmérséklete 2 °C. A nyár hűvös volt 18,3 °C-os átlaggal, július (139,1 mm), augusztus (142,2 mm) és október (119,2 mm) pedig csapadékos. Az év csapadékos napjainak száma 165. Júliusban 22, augusztusban pedig 23 nap esett az eső, vagy záporosó. Csak július 20-án volt 30 °C feletti hőmérséklet, 31,3 °C. A 39 zivataros naphoz júliusban 12-t és augusztusban rekordmennyiséget, 15-öt észleltek.

1956. 8,3 °C 582,7 mm

Az eddig mért leghidegebb hónap a hűvös és száraz év februárja. Átlaghőmérséklete -9,7 °C. 15 nap volt az átlag -10 °C alatt, ebből 3 nap -15 °C alatt (16-án -18,0 °C). Mindössze 2 nap mértek pozitív hőmérsékletet. A legalacsonyabb hőmérsékletek: 15-én -22,3 °C, 16-, 17-én -26,6 °C és 28-án -20,4 °C. 19 nap hullott a hó és 26 nap volt összefüggő hótakaró, mely 19-én érte el a legnagyobb vastagságot, 44 cm-t. A nyár is hűvös volt 18,4 °C-kal. Június átlaga 16,6 °C és annak ellenére, hogy 19 nap esett az eső-záporosó és 11 zivatar volt, nem hullott jelentős mennyiségű csapadék. Július is 10 zivataros nappal zárt. Az év során, 57 napon esett a hó.

1957. 10,1 °C 559,2 mm

A száraz év hideg (-4,0 °C), havas januárral kezdődött. 10 nap hullott a hó, mely egész hónapban megmaradt, de vastagsága csak 20 cm-t ért el 25-én. A hőmérséklet 19-én volt a legalacsonyabb, -20,6 °C. Májusban a 9-i -3,6 °C nem kímélte a gyümölcsösöket. Júniusban 8, júliusban 7 zivataros napot számoltak. Július volt a legcsapadékosabb hónap 109,8 mm-rel és 14 esős nappal. A hónap még 3 forró nappal is büszkélkedhet. 6-án 36,4 °C, 7-én 36,5 °C és 8-án 37,0 °C volt a maximum-hőmérséklet.

1958. 10,5 °C 686,4 mm

Az év leghidegebb napja január 28-a volt -19,3 °C-kal, a legmelegebb pedig augusztus 2-a 34,5 °C-kal. Amíg február átlaghőmérséklete nagyon enyhe, 4,3 °C 13-án 18,9 °C-os maximummal, addig márciusé csak 1,6 °C volt. Márciusban 12 nap havazott és 10 nap meg is maradt a hó a talajon. Május 27-én a hőmérő rendkívül meleget, 32,3 °C-ot mutatott. Júniusban sok volt a csapadék (16 nap alatt 180,5 mm), melynek nagy része, 116,1 mm 10- és 13-a között esett. A legtöbb a 10-i zivatarból, 51,7 mm.

1959. 9,9 °C 843,5 mm

Csapadékos, zivataros nyárral jellemezhetjük az évet. Májustól augusztusig 494,2 mm csapadék hullott. Júniusban 9, júliusban 8 zivataros nap volt. A július 13-i zivatarból 35,9 mm, a 20-iból pedig 41,7 mm záporosó esett.

1960. 10,0 °C 764,8 mm

Átlagos év szélsőségekkel. Míg január 15-én -18,2 °C-ot mértek, addig 29-én 15,9 °C-ot. 8 nap havazott, 14 nap volt hótakaró, de a hó csak 20 cm vastagságot ért el 13-án. Február 29-én a hőmérő 19,5 °C-ot mutatott. November is rendhagyó a 4-i 22,4 °C-os maximummal és az 5-i zivatarral. A nyári hónapok átlaga csak 18,3 °C. Különösen július volt hűvös 17,6 °C-kal. A hónap folyamán 17 nap alatt 135,7 mm csapadék hullott. A második legcsapadékosabb hónap november 129,9 mm-rel. Áprilisban 6 (szintén rendhagyó), június, július és augusztusban pedig 7 zivataros napot számláltak.

1961. 10,5 °C 617,3 mm

Az átlagos év leghidegebb napja január 28-a -18,4 °C-kal, a legmelegebb pedig augusztus 11-e 34,9 °C-kal. Áprilisban 5, májusban 7 és júniusban 6 nap volt zivatar. Májusban 17 nap hullott némi csapadék, de a legcsapadékosabb hónap július volt 102 mm-rel. Decemberben 10 havas napot jegyeztek fel.

1962. 8,8 °C 877,2 mm

A hűvös év elhúzódó téllal kezdődött. Februárban 17, márciusban 15 nap havazott. Az átlagosnál jóval hűvösebb volt május és június hó 13,7, ill. 16,4 °C-kal, valamint a nyár is 18,2 °C-kal. Májusban 6, júliusban 7 zivataros napot jegyeztek fel. Júliusban 155,9 mm, novemberben pedig 22 nap alatt 202,0 mm csapadék hullott. A legcsapadékosabb nap a július 3-i zivatar volt 59,3 mm-rel. A november 22-től kezdődő havazás folytán a hóvastagság 26-ra 44 cm-re hízott és a hótakaró a következő évre is áthúzódott. Aztán egy kemény tél következett. December átlaghőmérséklete -3,9 °C volt. Az év leghidegebb napja december 28-a -17 °C-kal.

1963. 9,1 °C 723,3 mm

Kemény tél volt az év elején és végén is 66 hideg, 38 zord és 82 hótakarós nappal. Az 1962–63-as tél átlaghőmérséklete -5,1 °C. Januáré -6,8 °C, februáré -4,7 °C és márciusé is csak 2,8 °C. Januárban 11 nap -10 °C alatt maradt az átlag. A nyár 20,2 °C-kal és november (16-án 24,2 °C) 10,2 °C-kal az átlagosnál melegebb, december viszont -5 °C-kal nagyon hideg volt. A leghidegebb napok: január 16. (-24,6 °C), február 2. (-21,4 °C), március 1. (-21,5 °C) és december 19. (-22,9 °C). Legmelegebbek: július 26. (33,9 °C) és augusztus 7. (33,6 °C). A legtöbb csapadék augusztusban, 155,9 mm, 15 nap alatt hullott. Januárban 18, februárban 13 nap havazott. Az előző év november 22-től március 11-ig hó borította a tájat. A legnagyobb vastagságot, 64 cm-t, február 6-án mérték. Decemberben 13 nap havazott, 17 nap volt hótakaró, mely 22-én 31 cm-t ért el. Az évi 37 zivataros nappól 10-et júniusban, 7-et pedig augusztusban jegyeztek fel.

1964. 9,3 °C 740,0 mm

Az előző év hideg decembere után még zordabb januárral kezdődött az év (-7,1 °C), így a tél átlaghőmérséklete -4 °C volt. A leghidegebb napok: január 19-e és 20-a -20 °C-kal. Március szintén hűvös 2,5 °C-os átlaggal és 9-én -14,5 °C-os minimummal. Annak ellenére, hogy januárban 10 nap havazott, csak 1,3 mm csapadékmennyiséget mértek, de a hidegnek köszönhetően a december 14-től áthúzódó hótakaró február közepéig megmaradt. Január 1-én 25 cm volt a hóvastagság és március 8-án szintén, köszönhetően március 11 napi havazásának és a 13 napon át tartó hótakarónak. Októberben esett a legtöbb csapadék, 129,3 mm (a 12-i zivatarból 45,1 mm). Júniusban 11 zivataros nap volt és decemberben 12 nap havazott.

1965. 9,4 °C 1058,5 mm

A csapadékos év (160 csapadékos nap) enyhe januárral kezdődött 31-én 15,2 °C-os maximummal. Az év leghidegebb napja február 22-én volt, -16,9 °C. A májustól augusztusig lehullott csapadék mennyisége 537,9 mm. A legtöbbet a május 22-i zivatarból mérték, 45,9 mm-t. Májusban 132,7, júniusban 125,9, júliusban 189,9 és novemberben 162,1 mm eső-záporosó esett, viszont októberben csak 0,7 mm, az is egy napon, 29-én. Januárban és februárban is 14 nap havazott. Áprilisban 20, májusban 17, június és júliusban 15, novemberben pedig 19 nap hullott valamilyen csapadék, emiatt a nyár hűvös volt 18,5 °C-os átlaghőmérséklettel. Az év során 39 zivataros napot jegyeztek fel, ebből 8-at júniusban és 1955 augusztusával azonos rekordmennyiséget, 15-öt júliusban.

1966. 10,6 °C 885,9 mm

A kissé csapadékosnak mondható év eléggé szélsőséges volt. A hideg és havas januárt (-3,3 °C-os átlag és 13 nap havazott) nagyon enyhe február követte 7 °C-os átlaghőmérséklettel. Január 21-én -18,2 °C-ot, február 21-én pedig 18,6 °C-ot mértek. A hűvös, csapadékos és zivataros nyár átlaghőmérséklete 18,6 °C volt. Júniusban 143,4 mm, júliusban pedig 140 mm eső-záporosó esett. A legtöbb a június 19-i zivatarból, 53,5 mm. Júniusban 9 és júliusban 10 zivataros napot jegyeztek fel. A 14,4 °C-os, kellemesen meleg októbert – 20 nap volt 20 °C feletti maximum-hőmérséklet – esős november követte 135,9 mm-rel.

1967. 10,2 °C 676,1 mm

A januári átlaghőmérséklet -2,9 °C. Leghidegebb 11-én volt, -23,4 °C. A hónap folyamán 10 nap havazott és a több-kevesebb hó 3-tól február 20-ig meg is maradt. A legnagyobb vastagságot, 49 cm-t január 9-én mérték. A legcsapadékosabb hónapok: május 138,4 és szeptember 144,2 mm-rel. A május 30-i zivatarból 84,9 mm záporosó és az azt követő napon 25,3 mm eső esett. Az augusztusi 8 zivataros nap ellenére a nyár száraz volt, mindössze 91,6 mm csapadékkal.

1968. 10,0 °C 537,1 mm

A száraz év januárjában -3,1 °C volt az átlaghőmérséklet. 9 nap havazott, ami a hónap 23 napján meg is maradt. Április 24-én 28,8 °C-ot mutatott a hőmérő. Az év legmelegebb napja július 11-e 36,6 °C-kal, a leghidegebb pedig január 11-e -20,4 °C-kal. Augusztusban esett a legtöbb csapadék, 107 mm. Júliusban 9, augusztusban pedig 11 zivataros nap volt.

1969. 9,3 °C 782,9 mm

A kissé hűvösebb év az évi (63 nap), valamint a havi havas napok számát tekintve az első helyen áll. Januárban 13 nap havazott, 17 nap volt összefüggő hótakaró és a legalacsonyabb hőmérséklet 1-én $-22,0$ °C volt. Februárban szokatlanul sok, 120,8 mm csapadék hullott 15 havas nappal. A hónap 20 napját fedő hótakaró 7-én és 9-én 38 cm-t ért el. Az év legalacsonyabb hőmérsékletét is ebben a hónapban, 11-én mérték, $-22,2$ °C-ot. A május 19-i zivatarból esett a legtöbb csapadék, 52,6 mm. Még csapadékos volt: június (105,3 mm), augusztus (125,1 mm) és december (117,2 mm). November rendkívül meleg a $7,7$ °C-os átlagával és a 13-án mért $22,2$ °C-os maximumával, aztán az egész decembert betakarta a hó. 23 nap havazott (első hely) és a hó vastagsága 10-én elérte a 41 cm-t, 20-án pedig a 42 cm-t.

1970. 9,6 °C 683,2 mm

Az év első negyede havazással indult. Januárban 11, februárban 14, márciusban 11 és még áprilisban is 4 nap hullott a hó. A hótakaró januárban 25 nap (1-én 42 cm), márciusban pedig 10 nap (13-án 12 cm) borította a talajt. A legcsapadékosabb hónap március 112 mm-rel. Májusban 7, augusztusban 9 – és ami ritka –, november 15-én zivatar volt. A legmagasabb hőmérsékletet, $38,5$ °C-ot, augusztus 17-én mérték. Az év érdekessége, hogy a novemberi hőmérsékletek szinte megegyeznek az előző évivel. Az átlag $7,7$ °C, a maximum 3-án $20,2$ °C.

1971. 9,6 °C 590,4 mm

Egy szárazabb év. Januárban 23 hótakarós nap volt, melynek vastagsága 4-én 35 cm-t ért el és aznap állt be az éves hőmérsékleti minimum is $-19,4$ °C-kal. Március hűvösebb volt, mint február és 8 nap havazott. Február átlaga $2,9$ °C, márciusé pedig csak $2,2$ °C. Június volt a legcsapadékosabb hónap 19 csapadékos nappal, 107,1 mm-rel. Az éves maximum-hőmérsékletet augusztus 7-én mérték, $34,8$ °C-ot. Májusban 7, júniusban 9 és júliusban 6 zivataros napot rögzítettek. A június 8-i zivatar csapadékmennyisége $34,3$ mm. November érdekessége, hogy míg 9-én $20,3$ °C-ot mértek, 22-én már $18,6$ mm hó hullott 22 cm-es vastagsággal.

1972. 9,8 °C 876,5 mm

Az előzőeknél csapadékosabb, zivataros év májusában 113,9 mm, júliusában 202,9 mm, augusztusában 144,5 mm és novemberében 113,3 mm, viszont decemberben csak 10,3 mm csapadék hullott. A nyári hónapok 43 napján esett záporosó, vagy eső. A július 10-től 15-ig tartó zivatarok, ill. esők csapadékmennyisége $158,9$ mm volt. Az augusztus 16-i zivatar is $55,1$ mm záporosót adott. Az évi 39 zivataros naphoz májusban 13-at, júniusban 7-et és augusztusban 11-et jegyeztek fel.

1973. 9,4 °C 748,5 mm

A havas januárban 23-án és 24-én mérték a legnagyobb hóvastagságot, 19 cm-t. Márciusban és áprilisban is 6 nap havazott. Április volt a legcsapadékosabb hónap. 20 nap alatt $152,8$ mm hó, havas eső, eső esett. Június és július szintén csapadékos $109,5$, ill. $100,4$ mm-rel. Júniusban 7, júliusban 9 zivataros napot jegyeztek fel és az év leghidegebb napja december 2-a volt $-17,2$ °C-kal.

1974. 10,4 °C 888,5 mm

Az 1973 – 74-es tél átlaghőmérséklete 2,2 °C, enyhe. Márciusban 5 nap havazott és májusban 18, augusztusban 17, októberben pedig 18 nap esett az eső, vagy záporosó. A legtöbb csapadék júniusban (101,5 mm), augusztusban (164,2 mm) és októberben (164,2 mm) hullott. A legcsapadékosabb napon, június 29-én 39,1 mm eső esett. Májusban 6, júniusban 8, augusztusban pedig 14 zivataros nap volt.

1975. 10,3 °C 683,0 mm

A szinte hómentes év (3 hótakarós nap) szokatlanul enyhe januárral kezdődött. Átlaghőmérséklete 3,5 °C volt és mindössze 8,8 mm csapadék hullott, így az 1974 – 75-ös tél átlaga 2,5 °C lett. A legcsapadékosabb hónapok: június 149 és augusztus 107,4 mm-rel. A rendkívül sok zivataros naphól (évi 42 nap) májusban 9-et, júniusban 10-et és júliusban 8-at jegyeztek fel. A legtöbb csapadék az augusztus 12-i zivatarból esett, 35,8 mm.

1976. 9,4 °C 706,2 mm

A száraz januárt és februárt (16,1, ill. 8,2 mm) hűvös és havas március követte 1,6 °C-os átlaghőmérséklettel, 7 havas és 10 hótakarós nappal. A 8-, 9-i havazás 29 cm hóvastagságot eredményezett. Az év leghidegebb napjai március 12-én és december 31-én voltak -18,8 °C-kal. Április 26-án 53,2 mm eső, a július 21-i zivatarból pedig 93,1 mm záporosó esett, ami a feldolgozott időszak egy napra eső legnagyobb csapadékmennyisége. A legcsapadékosabb hónapok: július és szeptember 159,3, ill. 108,8 mm-rel. Júliusban 9 zivataros nap volt és novemberben 17 nap esett az eső.

1977. 10,3 °C 611,4 mm

Az 1976–77-es tél átlaghőmérséklete enyhe, 2,2 °C volt, majd egy meleg (8,3 °C) és a végén havas március következett, 24-én 25 °C-os maximummal, 30-án pedig 11 cm hóval. Május volt a legszárazabb hónap 13,3 és november a legcsapadékosabb 102,9 mm-rel. November 13-án 52,3 mm eső esett. Júniusban 9 zivataros napot jegyeztek fel.

1978. 9,0 °C 645,4 mm

A kissé hűvösebb év januárjában 10, februárjában 12 és áprilisában 2 nap havazott. A hóvastagság február 19-én volt a legnagyobb, 20 cm és 21-én mérték az éves minimumot, -24,2 °C-ot. Április 15-én hullott a legtöbb csapadék, 41 mm havas eső és hó formájában. A legcsapadékosabb hónapok: május, 21 napi 113,6, valamint június, 101,1 mm esővel, záporral. A nyár hűvös volt 17,7 °C-os átlaghőmérséklettel. Mindössze egy nap, augusztus 7-én haladta meg a maximum a 30 °C-ot (30,6 °C). November szintén hűvös volt 1,3 °C-os átlaggal. Az év zivatarokban nem szűkölködött. A 44 zivataros naphól májusban és júniusban 9-et, júliusban 10-et és szeptemberben 7-et jegyeztek fel.

1979. 9,7 °C 814,7 mm

A szélsőséges január átlaghőmérséklete -2,4 °C volt. 19-én -15,3 °C-ot, 28-án pedig 15,5 °C-ot mértek. Januárban 15, februárban 9 nap havazott. A meleg június (19,9 °C) után hűvös július (17,7 °C) és augusztus (17,5 °C) következett, így a nyár átlaghőmérséklete 18,4 °C-ra csökkent. A legcsapadékosabb hónapok: június 133,2 mm-rel, 14 csapadékos nappal és július 109,5 mm-rel, 16 csapadékos nappal. A június 16-i zivatarból 42,7 mm, a 18-iból pedig 36,9 mm záporosó esett. Júniusban 10 és júliusban 9 zivataros nap volt.

1980. 8,6 °C 697,7 mm

A hűvös év hideg (-3,0 °C), havas januárral kezdődött. Az éves minimumot 13-án mérték, -18.2 °C-ot, 16 nap havazott és az egész hónapban több - kevesebb hó borította a talajt. Márciusban is 5, áprilisban pedig 3 nap esett a hó. Az átlagosnál jóval hűvösebb volt április (7,7 °C), május (12,2 °C) és a nyár is (18 °C). Júniusban 10 zivataros és 19 esős napot jegyeztek fel, mégis a legtöbb csapadék novemberben, 102 mm, 17 nap alatt hullott.

1981. 9,9 °C 665,4 mm

Január hideg volt -2,7 °C-os, március és október viszont meleg, 8,1 °C-os, ill. 11,9 °C-os átlaggal. Az éves minimum-hőmérsékletet, -16,6 °C-ot, január 17-én mérték. A legtöbb csapadék júniusban (14 nap alatt 166,3 mm) és decemberben (17 nap alatt 126,6 mm) esett. A június 16-i jégesős zivatar csapadékmennyisége 49,7 mm volt és decemberben 13 nap havazott.

1982. 9,9 °C 762,8 mm

Hideg január (-2,9 °C), meleg szeptember (17,3 °C) és enyhe december (3,8 °C) jellemezte az évet. Január 14-én -17,3 °C-ot, május 1-én -1,4 °C-ot, szeptember 6-án pedig 29,8 °C-ot mutatott a hőmérő. Januárban 14 nap esett a hó, mely 22 napon át takarta a talajt. Február száraz 4,4 mm-rel, július és augusztus viszont csapadékos volt 132,4, ill. 142,6 mm-rel. A július 12-i zivatarból 41 mm, az augusztus 17-iből rendkívüli, 69,6 mm záporosó esett. Júniusban és júliusban 10 zivataros, decemberben pedig 17 esős napot rögzítettek.

1983. 10,1 °C 532,5 mm

A száraz év enyhe januárral kezdődött (2,3 °C), majd havas februárral folytatódott. Februárban 13 nap hullott a hó és 21 hótakarós nap volt. A 6-tól 11-ig tartó havazásból 36 cm-nyi hó hullott. Az év leghidegebb napja is erre a hónapra esett, 23-án -16 °C-ot mértek. Április meleg volt 12,5 °C-os, július pedig forró 21,9 °C-os átlaggal. Júliusban 16 nap mértek 30 °C feletti hőmérsékletet és 28-án az éves maximumot, 36,3 °C-ot, valamint ebben a hónapban jegyezték fel a legtöbb zivatart is, 10 napot. A legtöbb csapadék, 43,2 mm, a szeptember 11-i zivatarból hullott.

1984. 9,3 °C 786,7 mm

Január szélsőséges és csapadékos, a nyár pedig hűvös volt 17,6 °C-os átlaggal. Január 3-án 14,7 °C-ot, ezzel ellentétben 27-én -14,8 °C-ot mértek. A havi csapadékösszeg 118,4 mm – szinte a hónap minden napján esett valamilyen csapadék. A 19-től hó végéig tartó havazás 24-én reggelre 24 cm hóvastagságot eredményezett, aztán a nap folyamán még 31,5 mm hó, havas eső hullott. Februárban 13 és márciusban is 9 nap havazott. Február hótakarós napjainak száma 17. Áprilisban 16, júniusban 17 és szeptemberben 14 nap esett az eső, vagy záporosó. Júniusban 100,3, szeptemberben 120,7 mm volt a csapadékmennyiség. A legcsapadékosabb napon, a szeptember 25-i zivatarból 46,9 mm záporosó esett. Szeptember 2-án 29 °C-os maximum-hőmérsékletet mértek.

1985. 8,8 °C 705,3 mm

Az alacsony éves átlaghőmérséklet az elmúlt évtized leghidegebb telének és a hűvös júniusnak tudható be. Január átlaghőmérséklete $-6,1$ °C, februáré $-4,4$ °C, de az 1984–85-ös tél már csak $-3,4$ °C, ami az előző év enyhe decemberének köszönhető. A hideg január és február hőmérséklete táj határok közt mozgott. Január 8-án $-24,6$ °C-ot, 12-én $-21,1$ °C-ot, 23-án pedig $14,6$ °C-ot jegyeztek fel. Az év leghidegebb napján, február 13-án -25 °C-ot mutatott a hőmérő. Januárban 12, februárban 10 nap havazott. A hótakarós napok száma januárban 24, februárban 17 volt. A legnagyobb hóvastagságot január 3-án mérték, 17 cm-t. A csapadékos tavasz, valamint a nyárelő márciusában 18, áprilisában és májusában 15, júniusában pedig 19 nap esett az eső, vagy záporosó. A legtöbb csapadék, $126,9$ mm, mégis novemberben, 15 nap alatt hullott. A november 18-tól 21-ig tartó havazás 16 cm-nyi hóvastagságot eredményezett. Májusban 10, júliusban 8 zivataros nap volt. December 29-én $17,3$ °C meleget mértek.

1986. 9,3 °C 654,5 mm

Gyakori havazással, hideg februárral ($-4,4$ °C) és hűvös márciussal ($2,7$ °C) kezdődött az év. Januárban 12, februárban 18, márciusban 9, ill. áprilisban 3 nap havazott. A hótakarós napok száma januárban 10, februárban 21 és márciusban 12 volt. A legnagyobb hóvastagságot február 18-án (33 cm) és március 4-én (36 cm) mérték. A leghidegebb napok: február 27-e -22 °C-kal, valamint 28-a $-22,6$ °C-kal. Április 25-én a maximum-hőmérséklet $26,2$ °C volt, majd ezt követően a 28-tól 30-ig átvonuló hidegfrontból $74,1$ mm záporosó, eső esett – a 29-i zivatarból a legtöbb, $55,9$ mm. Áprilisban 6, júniusban 10 zivataros napot jegyeztek fel. A legcsapadékosabb hónapban, júniusban 16 nap alatt $127,9$ mm csapadékot mértek.

1987. 9,1 °C 885,0 mm

A zord január átlaghőmérséklete $-4,8$ °C volt. 15 nap havazott és 21 nap takarta hó a talajt. 19-én a 10 napig tartó havazás 37 cm hóvastagságot eredményezett. 13-án, a leghidegebb napon $-25,5$ °C-ot, 31-én pedig -25 °C-ot mutatott a hőmérő. Március szintén hideg volt $-0,2$ °C-os átlaggal és 5-én $-19,7$ °C-os minimummal. 12 nap havazott, ami 7 nap meg is maradt a talajon. Májusban 18 nap esett az eső-záporosó (7 zivataros nap) $112,7$ mm összmennyiséggel. Július meleg (21 °C), augusztus csapadékos (17 nap alatt $163,8$ mm), szeptember szintén meleg ($17,3$ °C) és november is csapadékos (19 nap alatt $102,1$ mm) volt. A legmagasabb hőmérsékletet, $33,1$ °C-ot július 23-án, a legtöbb napi csapadékot, $44,6$ mm-t pedig a július 9-i zivatarból mérték.

1988. 9,8 °C 657,8 mm

A rendhagyó év januárjának és februárjának átlaghőmérséklete $3,1$ °C, a leghidegebb hónapé, novemberé pedig $-0,2$ °C volt. Január 29-én $16,8$ °C, február 7-én $17,2$ °C maximumot mértek. A legmelegebb napok: július 24-e 35 °C-kal és augusztus 15-e $35,2$ °C-kal. A leghidegebb: november 24-e $-17,2$ °C-kal. Februárban 15, márciusban 17 nap esett az eső. Április 23-án rendkívüli, 16 cm-nyi hó hullott. Május száraz volt $18,5$ mm, szeptember és október pedig csapadékos $100,7$, ill. $102,1$ mm összmennyiséggel. A legcsapadékosabb napokon, szeptember 2-án $42,4$ mm, 13-án $41,7$ mm és október 7-én 46 mm eső-záporosó esett. November 21-én 14 cm-es hó-vastagságot jegyeztek fel.

1989. 10,1 °C 608,7 mm

Szokatlanul enyhe február (3,6 °C), március (8,6 °C) és hűvös június (16,3 °C) a rendhagyó, szinte hómentes (mindössze 1 hótakarós nap), száraz év jellemzője. Február 24-én 18,5 °C, március 29-én pedig 25,6 °C maximum-hőmérsékletet mutatott a hőmérő. Az átlagostól eltértek az év végi hőmérsékletek is november 1-én 21 °C-os, 30-án -12 °C-os, december 11-én -13 °C-os és 17-én 21,1 °C-os maximummal, ill. minimummal. Január és október volt a legszárazabb (5,5 mm, ill. 15 mm) és augusztus a legcsapadékosabb (127,4 mm) hónap. Áprilisban 17, májusban és júniusban pedig 15 nap esett némi csapadék. Májusban 8, júliusban 10 és augusztusban 9 zivataros napot jegyeztek fel. A legtöbb csapadék a július 31-i zivatarból hullott, 39,2 mm.

1990. 10,3 °C 659,4 mm

Az előző évinél még enyhébb februárral (5,4 °C) és az év eleji zivatarokkal (januárban, februárban és márciusban is 1-1 nap) emelkedik ki az év. A január 26-i zivatarból 29,2 mm záporosó esett. Február 25-én 18,6 °C, március 22-én pedig 24 °C maximum-hőmérsékletet mértek, így 8,2 °C-kal március átlaghőmérséklete is kellemesen enyhe lett. Januárban 2, júniustól szeptemberig és decemberben 17-17 nap hullott több-kevesebb csapadék. Augusztusban a legkevesebb, 16,1 mm és szeptemberben a legtöbb, 135,2 mm. A legcsapadékosabb napon, a június 8-i zivatarból 36,4 mm záporosó esett. Májusban 9 zivataros nap volt. Az évi 10 hótakarós naphoz 1-et februárban és 9-et decemberben jegyeztek fel.

1991. 9,3 °C 759,1 mm

Kissé hűvösebb év. Januárt követően – amikor 11-én még 15 °C-ot mutatott a hőmérő – hideg, havas február következett -3,5 °C-os átlaggal, 15-én -16,4 °C-os minimummal, 8 havas, 16 hótakarós nappal és 13-án 18 cm-es hóvastagsággal. 15 nap mértek -10 °C, vagy az alatti hőmérsékletet. Március végén 4 nap és áprilisban 3 nap havazott, májusban pedig 19 nap esett az eső. Április (8,5 °C) és május (11,8 °C) hűvösebb, december (-1,4 °C) hidegebb, július (21,3 °C) viszont melegebb volt az átlagosnál. Júliusban 22 nap 20 °C feletti átlaghőmérsékletet, valamint 8 nap 30 °C, vagy afeletti maximum-hőmérsékletet mértek 13-án 35,1 °C-kal. Az év eleje és vége szárazabb, május (109 mm), június (124,2 mm), október (109,4 mm) és november (115,6 mm) csapadékosabb volt.

1992. 10,7 °C 631,3 mm

Az év kiemelkedő eseménye volt a száraz január (9,7 mm), a forró, száraz augusztus (23 °C-os átlag, 4,9 mm) és a csapadékos október (158 mm). Augusztusban 29 nap volt 20 °C feletti átlaghőmérséklet és 25 nap 30 °C feletti maximum-hőmérséklet 21-én 36,9 °C-kal. Októberben 21 nap esett az eső, vagy záporosó, a 29-, 30-i zivatarból a legtöbb, 80,3 mm. November 16-án 42,4 mm eső esett. Az év hótakarós napjainak száma 10 volt – januárban és februárban.

1993. 9,7 °C 788,2 mm

Az előző évhez hasonlóan száraz januárral kezdődött az év (4,3 mm). A legalacsonyabb hőmérsékletet is januárban mérték, 5-én -17,8 °C-ot. Február havas, 25-én 24 cm-es hóvastagsággal és a hűvös március (4,3 °C) úgyszintén. Márciusban 8 nap havazott és ugyanannyi volt a hótakarós napok száma is. Az évi 41 zivataros naphoz májusban és júniusban jegyezték fel a legtöbbet, 9, ill. 8 napot. A június 7-i jégesős zivatarból 32,3 mm, a július 18-i jégmentesből pedig 66,7 mm csapadék hullott. Júliusban (121,1 mm) és az év utolsó három hónapjában (342,4 mm) esett a legtöbb eső, vagy záporosó. Augusztus 4-én mutatta a hőmérő a legmagasabb értéket, 35,5 °C-ot. A csapadékos napok számát nézve (24) az első helyen álló hűvös november 1,4 °C-os átlagával, 14 havas és 15 hótakarós napjával is rendhagyó. Decemberben 20 hótakarós nap volt 1-én az év legnagyobb, 51 cm-es hóvastagságával.

1994. 11,3 °C 786,0 mm

1951 óta nem volt ilyen meleg év. Az enyhe január átlaghőmérséklete 3,1 °C és annak ellenére, hogy nem havazott, az elmúlt decemberről átnyúló hótakaró következtében 1-én mérték az év legnagyobb hóvastagságát, 15 cm-t. Az 1993–94-es tél szintén enyhe 2,1 °C-kal. Az éves minimumot (-15 °C) február 16-án, a maximumot pedig július 31-én és augusztus 1-én (35 °C) rögzítették. A 21,9 °C-os forró júliusban 27 nap volt 20 °C feletti átlag és 15 nap 30 °C, vagy afeletti maximum. A nyár legmelegebb időszakában, július 12-től 32 napon át 20 °C feletti átlaghőmérséklet, valamint 23-tól 20 napon át 30 °C, vagy afeletti maximum-hőmérséklet volt és még szeptember 2-án is 31 °C-ot mértek. A legcsapadékosabb hónapokban, áprilisban 108 mm, augusztusban 145,2 mm és októberben 105,6 mm, a legcsapadékosabb napon pedig, az augusztus 13-i jégesős zivatarból 53,6 mm csapadék hullott.

1995. 10,1 °C 925,0 mm

A csapadékos, 46 zivataros napjával az első helyen álló év érdekessége még, hogy március (4,8 °C) hűvösebb volt a nagyon enyhe februárnál (5,1 °C), július pedig az előző évihez hasonlóan forró (21,7 °C). Januárban és decemberben 13, márciusban 9 nap havazott. Decemberben a 20 napig tartó hótakaró 14-én 27 cm vastagságot ért el. A legtöbb csapadék júniusban (19 nap alatt 111,1 mm), augusztusban (109,8 mm) és szeptemberben (138,5 mm), a legkevesebb pedig októberben (1,1 mm) hullott. A legcsapadékosabb napokon, a február 26-i zivatarból 43,9 mm, a július 5-iből 62 mm és az augusztus 28-iből 51,4 mm záporosó, valamint szeptember 14-én 56,8 mm eső esett.

1996. 8,9 °C 856,2 mm

Hűvösebb, csapadékosabb év hideg, havas téllal, 56 havas nappal. Január átlaghőmérséklete -2,4 °C volt 21 hótakarós nappal és 28-tól 30-ig 24 cm-es hóvastagsággal. Február még hidegebb -2,8 °C-os átlaggal, 10-én -20,6 °C-os minimummal, valamint 20 hótakarós nappal. A hűvös márciusban (2,4 °C) annak ellenére, hogy 11 nap havazott, csak 12,1 mm csapadék hullott. Áprilisban a 121,4 mm csapadék 17 nap alatt esett le, melyből 6 nap havazott, és ami két reggel teljesen befedte a talajt. Csapadékos volt még augusztus 141,9 mm-rel, ill. szeptember a 20 nap alatt leesett 157,3 mm-rel. Az év csapadékos napjainak száma 165 volt. A legcsapadékosabb napon, szeptember 23-án 41,6 mm esőt mértek. December átlaghőmérséklete az év végi kemény fagyoknak köszönhetően -2,1 °C volt. Karácsony másnapjától január 1-ig -10 °C alatt maradt az átlaghőmérséklet 31-én -22,6 °C-os minimummal. Az év legmelegebb napján, június 11-én 33,9 °C-ot mutatott a hőmérő.

1997. 9,7 °C 720,1 mm

Az év legalacsonyabb hőmérsékletét, -15,5 °C-ot január 1-én mérték. A hó előző év december 23-tól február 1-ig takarta a talaj, mely január 3-án volt a legnagyobb, 15 cm. Januárban 16, márciusban és áprilisban 6 nap havazott. Az április 14-i -7,3 °C nagy kárt okozhatott a gazdaságokban, mint ahogy a július 13-i jégesővel kísért zivatar is. A legkevesebb csapadék februárban (15,5 mm) és márciusban (12,6 mm), a legtöbb júniusban (125,7 mm), júliusban (20 nap alatt 133,2 mm) és novemberben (106,7 mm) hullott. Október hűvös volt 7,8 °C-os átlaggal és 30-án -8,7 °C minimummal. Ezt követően november 7-én 22,7 °C-ra szökött fel a hőmérő higanyszála, majd a 12-, 13-i zivatarból 75 mm záporosó esett. December 3-a szintén sok esőt adott, 39,7 mm-t.

1998. 9,9 °C 1055,1 mm

Erősen csapadékos év 39 zivataros nappal. 1997–98 telének átlaghőmérséklete enyhe volt (2,5 °C) február 13-án 21,5 °C-os maximummal. A száraz februárban (2,4 mm) mindössze 2 csapadékos nap volt, viszont a hűvös márciusban (4,1 °C) 9 nap havazott és 12-én -10,2 °C-ot mutatott a hőmérő. Májustól novemberig 882 mm csapadék hullott, melyből nyáron 375,8 mm, ősszel pedig 409 mm. A legcsapadékosabb hónap szeptember volt 182,8 mm-rel. Júniusban 16, júliusban 14, szeptemberben 17, októberben 14 és novemberben 18 nap esett változó mennyiségű csapadék. A legtöbb a június 22-i jégesős zivatarból, 84,2 mm. Az augusztus 22-i és 24-i zivatarból, 47,9, ill. 45,5 mm. Szeptember 12-től 14-ig 92,1 (ebből a legtöbb 12-én, 60,5 mm), az október 18-, 19-i zivatarból 65,3 (a hónapban 4 zivataros nap volt), valamint november 4-én 39,3 mm eső-záporosó esett. A legmagasabb hőmérsékletet, 33,5 °C-ot augusztus 3-án, a legalacsonyabbat, -14,6 °C-ot pedig december 10-én mérték. Az év hóborította tájjal búcsúzott. Novemberben 11, decemberben 15 nap havazott. A hideg decemberben (-2,9 °C) 18 hótakarós nap volt 5-én 16 cm-es hóvastagsággal.

1999. 10,3 °C 765,3 mm

Az 1998–99-es tél átlaghőmérséklete kissé hideg, -1,1 °C volt. Február 14 havas, 12 hótakarós és az év leghidegebb napjával (16-án -17 °C), valamint a 12-i 31 cm-es hóvastagságával tűnik ki. Május 31-én 31,6 °C-ot, július 6-án, az év legmelegebb napján pedig 33,1 °C-ot mutatott a hőmérő. A június 11-i zivatarból 38,1 mm záporosó esett, a november 19-i havazásból pedig 34,1 mm hó hullott 41 cm-es hóvastagsággal. Novemberben és decemberben is 13 hótakarós napot jegyeztek fel.

2000. 11,2 °C 505,3 mm

A rendkívül száraz, kissé melegebb év hideg januárral kezdődött (-1,7 °C). Annak ellenére, hogy 17 nap havazott, csak 7 hótakarós nap volt mindössze 3 cm-es hóvastagsággal. Az év során a legkevesebb csapadékot is ebben a hónapban mérték, 6,9 mm-t. Február átlaghőmérséklete 3,6 °C-kal enyhe volt. A május 12-i zivatarból hullott a legtöbb csapadék, 35 mm és augusztus 20-án volt a legmagasabb hőmérséklet, 37,2 °C. November 14-én is magas, 22,9 °C-os hőmérsékletet mutatott a hőmérő és december sem volt hideg (2,6 °C). Az év során mindössze 20 zivataros napot jegyeztek fel.

2001. 10,4 °C 644,4 mm

Egy enyhe tél (2,6 °C) után, ahol január 7-én 15,8 °C-ot mértek, száraz február (6,8 mm) következett. Április a 15-i -5,4 °C-os faggal károsította a fiatal hajtásokat. Június hűvös és csapadékos volt 17,2 °C-os átlagával és 112,3 mm esővel, záporosóval. A 3-i zivatarból 53,9 mm záporosó esett. A hőmérő a legmagasabb értéket augusztus 4-én mutatta, 35,1 °C-ot. Szeptember volt a legcsapadékosabb hónap 141,7 mm-rel, majd egy száraz október (7,8 mm) után hideg, havas decemberrel zárult az év -3,7 °C-os átlaggal, 15 havas és 20 hótakarós nappal, valamint 27-én 15 cm-es hóvastagsággal.

2002. 11,2 °C 560,4 mm

Egy év múltán újabb melegebb, szárazabb év következett. Ugyan január 5-én -15,1 °C-ot mutatott a hőmérő, de 29-én már 17,7 °C-ot és február 13-án is 17,1 °C-ot. Az első negyedév volt a legszárazabb a januári 5,2 mm-es és a márciusi 8,2 mm-es csapadékösszegével. A legcsapadékosabb napon, a május 25-i zivatarból is csak 14,4 mm jégeső, záporosó esett. Ahogy az előző évben, úgy most is az áprilisi fagy okozott kárt a gyümölcsösökben. 8-án -6,2 °C volt a minimum-hőmérséklet. A legmagasabb hőmérsékletet, 34,9 °C-ot, június 23-án mérték. November 15-én is szokatlanul meleg, 23,9 °C volt.

2003. 10,2 °C 572,0 mm

Száraz év hideg, havas téllal és forró nyárral. Ha a hőségnapok számát nézzük, ebben az évben volt a legtöbb, 56, de a nyári napok számával, 114-el és a hideg napokéval, 59-el is előkelő helyen áll. 2002–2003 telének átlaghőmérséklete -1,9 °C volt. Enyhe december után hideg január és február következett -2,6 °C, ill. -3,7 °C átlaggal. Január 3-án ugyan 16,1 °C-ot mutatott a hőmérő, de 6-tól 25-ig már hó borította a talajt 13-án -19 °C-os minimum-hőmérséklettel, majd az újabb havazások és hideg következtében 31-től egészen március 3-ig húzódott el a hótakaró. Januárban 16, februárban 13, márciusban és áprilisban 3 nap havazott. Február 4-én 25 cm hó hullott és 13-án -18,3 °C-ot mértek. Március száraz volt 7,1 mm csapadékkal, április pedig hűvös 9,4 °C-os átlaggal, aztán májustól egy forró időszak következett. Május 6-tól 9-ig a hőmérséklet meghaladta a 30 °C-ot, így 17,7 °C lett a hónap átlaga, pedig 16-án -0,3 °C-ot is mértek. Júniusban 15 nap volt 30 °C, vagy afeletti hőmérséklet 23-án 35,2 °C-os maximummal, júliusban 11 nap, 22-én 35,3 °C-kal és augusztusban a legtöbb, 25 nap, 14-én 37,7 °C-kal. A nyár átlaghőmérséklete 22,1 °C volt, mellyel 1917-tel vállvetve az első helyen áll. Júliusban 10, augusztusban 7 zivataros napot jegyeztek fel. A hűvös októberben (8 °C) 3 nap havazott.

2004. 9,9 °C 834,0 mm

A kissé csapadékosabb év havas negyedévvél kezdődött. Januárban 15 nap hullott a hó és az átlaghőmérséklet -1,9 °C volt. Február 5-én 18,5 °C-ra szökött fel a hőmérő higanyszála, aztán 14 havas nap következett. 25-től március 13-ig fedte hó a talajt, 9-én 26 cm-es hóvastagsággal. Március elején 8 nap havazott, de 19-én már 24,1 °C maximum-hőmérsékletet mértek. Április csapadékos (119,9 mm), május hűvös (13,7 °C) 23-án jégesóval, június csapadékos (129,8 mm) 8 zivataros nappal, ill. 18-án 41,6 mm záporosóval és október szintén csapadékos (133,7 mm) volt. A legtöbb zivataros napot, 10-et, augusztusban észlelték, a legmelegebb hőmérsékletet pedig július 22-én, 34,2 °C-ot.

2005.**9,3 °C****859,4 mm**

A közelmúlt legpusztítóbb viharáról híres a kissé hűvösebb, csapadékosabb év. Január (-1,2 °C), február (-2,5 °C), március (3,6 °C) és augusztus (18 °C) volt hidegebb, ill. hűvösebb az átlagosnál. Januárban 10, februárban 17 és márciusban 5 nap havazott. Január 25-től március 15-ig többkevesebb hó borította a talajt, melynek vastagsága január 27-én 23 cm volt. Február 9-én -21,6 °C-ot, 10-én -22 °C-ot mértek, de a március 2-i -17,5 °C is rendkívül hidegnek számít. A március 27-i 39,5 mm csapadékot eredményező zivatar szintén rendkívüli, ahogy az áprilisi 114,1 mm csapadék után a május 29-i 32,1 °C-os hőmérséklet is. Június 28-án reggel labilis légköri állapot volt megfigyelhető a magasabb tartományokban. Délben a változó irányú szél északira fordult, megerősödött és a kevés csapadékot adó zivatarfelhő 3 órakor elhagyta a várost. Du. 6 órára, a következő hullámban érkezett meg a szupercella, mely középpontjában, a közép-keleti városrészen hatalmas pusztítással vonult át. Magas, több évtizedes fákat döntött ki, vagy tört derékba az Eötvös tértől a Sétakertig. A meteorológiai állomást csak a peremével érintette, de ott is 84 km/h-s széllökést regisztrált a szélmérő. A 28-i jégesővel kísért, valamint a másnap esti zivatarból 69,3 mm csapadékmennyiséget mértek. Augusztus 21-, 22-én szintén egy jégesős zivatar vonult végig a városon 54,6 mm csapadékot hagyva maga után. Júliusban 112,3 mm, augusztusban 153,4 mm, októberben viszont csak 5,2 mm eső-záporosó, jégeső esett. Decemberben 14 nap havazott és a hó vastagsága 30-án 29 cm volt. Az év során összesen 55 havas napot jegyeztek fel. A legmagasabb hőmérsékletet, 34,1 °C-ot július 29-én mutatta a hőmérő.

2006.**10,1 °C****690,1 mm**

Hideg január és forró július jellemezte az évet. A 2005. december 27-ről áthúzódó hótakaró február 15-ig fedte a talajt. Januárban 7, februárban 14 és márciusban 10 nap havazott. Január 1-én 21 cm, március 6-án pedig 13 cm hóvastagságot mértek. Január átlaghőmérséklete -3,3 °C, februáré -0,1 °C és márciusé hűvös, 4,0 °C volt. Január 25-én jegyezték fel a leghidegebb, -16,9 °C-os és június 27-én a legmelegebb, 34,6 °C-os hőmérsékletet. Június 13-án jégeső okozott kisebb-nagyobb károkat. A forró, 21,9 °C-os júliusban 23 nap volt 20 °C felett az átlaghőmérséklet, valamint 18 nap 30 °C felett a maximum-hőmérséklet. Ezt követően hűvös (17,6 °C), csapadékos (131,8 mm) augusztus következett 8 zivataros nappal, de a 20-i vihar, mely a budapesti tragédiát okozta és következtében az észlelőknek el kellett hagyniuk az állomást, Nagykanizsát nem érintette. Ezen kívül még májusban (124,4 mm) és júniusban (113,6 mm) esett sok eső, vagy záporosó. December enyhe volt (2,7 °C) 6-án 17,6 °C-os maximummal.

2007.**11,0 °C****760,5 mm**

Ez az év tartja Nagykanizsa maximum-hőmérsékletének rekordját, 39,1 °C-ot. Április 1-től az állomáson megszűnt az észlelés és ettől kezdődően csak automata adatok állnak rendelkezésre. A 2006–2007-es tél nagyon enyhe (4 °C), a nyár meleg (20,8 °C), az év vége viszont hűvösebb volt. Január 11-én 15,9 °C-ot, június 21-én 34,9 °C-ot, július 20-án a melegrekordot, 39,1 °C-ot és augusztus 16-án 33,5 °C-ot mért az automata. Július forró volt 21,9 °C-os átlaggal, 16-tól 22-ig 25 °C feletti átlaghőmérséklettel és 35 °C feletti a maximum-hőmérséklettel. Az év legalacsonyabb hőmérséklete, -11,1 °C, december 19-én volt. A legkevesebb csapadék áprilisban (6,3 mm), a legtöbb pedig szeptemberben (146 mm) esett, 18-án 54,1 mm össz mennyiséggel.

2008. 11,0 °C 617,5 mm

2007 átlaghőmérsékletével azonos, újabb meleg, kissé szárazabb év következett. Januárban nagyon kevés, 6,5 mm csapadék hullott, ahogy februárban is csak 8,4 mm. Ugyan február 17-én (-12,4 °C) volt az év legalacsonyabb hőmérséklete, de a hónap átlaga nagyon enyhe (3,6 °C) 25-én 20,7 °C-os maximummal. Május 27-, 28-án szintén szokatlanul magas értéket, 33,3 °C-ot mutatott a hőmérő, melytől a legmagasabb, az augusztus 15-i 33,8 °C-os hőmérséklet alig tért el. A szeptember 6-i 32,6 °C és a november 3-i 21 °C is kimagasló érték. December átlaghőmérséklete szintén enyhe, 2,4 °C volt. A legcsapadékosabb hónapban, júniusban 111,6 mm eső-záporosó esett, melynek nagy része, 64,4 mm három napra (5-től 7-ig) tehető. A legcsapadékosabb nap július 23-a volt mindössze 29,6 mm csapadékmennyiséggel.

2009. 11,0 °C 763,2 mm

Az előző két évvel azonos átlaghőmérsékletű meleg év. Január hidegebb (-2,3 °C), április viszont melegebb (13,6 °C) volt az átlagosnál. A legmagasabb hőmérsékletet, 34 °C-ot, augusztus 2-án mutatta a hőmérő, de meleg volt október 5-én és 6-án is (27,2 °C). December hőmérséklete rendkívüli méretékben változott. 20-án -14,8 °C-os átlag mellett -20 °C-os, 21-én -6,3 °C mellett -20,3 °C-os minimumot, két nap múlva, 23-án 9,1 °C mellett 17,1 °C-os, 24-én 10,4 °C mellett 15,4 °C-os és 25-én 13,2 °C mellett 18 °C-os maximumot mért az automata. Nagy mennyiségű csapadék csak júniusban esett (151,5 mm), 16-án 27,5 mm.

2010. 10,0 °C 968,8 mm

A csapadékos év januárjának átlaghőmérséklete kissé hideg, -1,5 °C volt. A négy legcsapadékosabb hónap: május (103,9 mm), június (133,9 mm), augusztus (142 mm) és szeptember (165,8 mm). Május 15-, 16-án 52,2 mm, szeptember 16-tól 18-ig pedig 91,8 mm csapadék hullott. Július meleg 21,7 °C-os átlaggal és 15-én 34,7 °C-os maximummal, október hűvösebb 7,7 °C-os átlaggal, november melegebb 7,4 °C-os átlaggal, 15-én 20,6 °C maximummal és december kissé hideg volt -0,8 °C-os átlaggal. December 8-án 16,9 °C-ot, 19-én pedig, az év leghidegebb napján -20,6 °C-ot mutatott a hőmérő.

2011. 10,4 °C 460,9 mm

A legszárazabb év. Nem csak a csapadékhiány okozott nagy szárazságot, hanem annak eloszlása is. Az évi csapadékmennyiség 62%-a, 288 mm 17 nap alatt hullott le. A legtöbb június 9-én, 35,8 mm. Az első negyedév csapadékösszege 25,9 mm, novemberé pedig 0,5 mm volt 1 esős nappal. Az év hőmérsékleti eloszlásában kisebb eltérés mutatkozik. Február kissé hideg (-0,2 °C), augusztus forró (21,1 °C), szeptember meleg (17,7), november hűvösebb (1,7 °C) és december enyhébb (2,7 °C) volt. Kiemelkedő értékek: január 9. 15,5 °C, február 7. 16,8 °C, március 8. -10 °C, március 25. 22,3 °C, május 6. -1,8 °C, május 27. 30,7 °C, július 9. 35,8 °C, augusztus 24. 36,6 °C, szeptember 11. 32,7 °C, október 1. 27,2 °C és december 4. 15,1 °C.

2012. 11,1 °C 462,4 mm

Az előző legszárazabb évet a második legszárazabb, meleg év követte. A forró napok számát nézve 13 nappal magasan az első helyen, a hőségnapokét nézve, 52-vel a második helyen áll. Január enyhe (1,5 °C), február viszont hideg és száraz volt (-2,9 °C) a hónap elején négy, -10 °C alatti átlaghőmérsékletű nappal, 9-én -18,7 °C-os minimummal, 24-én 17,9 °C-os maximummal és mindössze 9 mm csapadékkal. A legszárazabb hónap, március (0,5 mm 1 napon) az átlagosnál melegebb volt (7,6 °C), április pedig a 29-i 30,1 °C-os hőmérsékletével rendhagyó. Május 1-én 30,5 °C-ot, 2-án 30 °C-ot, viszont 18-án -1,9 °C-ot mutatott a hőmérő, aztán egy forró időszak következett júniusban 9, júliusban 16, augusztusban 20 és szeptemberben 4 hőségnappal. Július még 5 forró napjával, 22,3 °C-os átlaghőmérsékletével, ill. a 11-i éves csapadékmaximumot jelentő 20,1 mm-rel emelkedik ki, augusztus pedig a 22-i 38,1 °C-os éves maximum-hőmérsékletével, 7 forró napjával, valamint kevés, 7,2 mm-nyi csapadékmennyiségével, melynek zöme, 6,7 mm 26-án esett le. Így a nyár átlaghőmérséklete 21,6 °C lett. Szeptember szintén meleg volt 16,9 °C-os átlagával, 4 hőségnapjával és 11-én 31,9 °C-os maximumával, ahogy november is a 8 °C-os átlaggal. A szárazságot ebben az évben is fokozta az évi csapadékmennyiség egyenlőtlen eloszlása. 63%-a, 291,6 mm 28 nap alatt esett le.

2013. 10,5 °C 755,7 mm

Március hűvösebb (3,8 °C), július melegebb (21,3 °C), november és december kissé enyhébb volt az átlagosnál. Január 27-én, a leghidegebb napon -12,1 °C-ot, április 30-án 27,7 °C-ot, július 29-én 36,4 °C-ot, a legmelegebb napon, augusztus 8-án 38,4 °C-ot, ill. november 3-án 20,7 °C-ot mutatott a hőmérő. November volt a legcsapadékosabb (136 mm) és december a legszárazabb (4,3 mm) hónap. November 3-tól 5-ig 46,7 mm, 9-től 10-ig 47,5 mm, melyből 10-én 30,2 mm eső-záporosó esett.

2014. 11,8 °C 1016,8 mm

A legmelegebb év szinte kimagasló hőmérsékleti értékek nélkül, sok csapadékkal. Az első négy és utolsó három hónap hőmérséklete tért el leginkább az átlagostól. Az enyhe januárnak (3,3 °C) és februárnak (4,4 °C) köszönhetően a 2013–14-es tél átlaghőmérséklete melegebb, 3,8 °C volt, ahogy az év végén októberé (12,5 °C), novemberé (8,1 °C) és decemberé (3,1 °C) is. Kissé magasabb hőmérsékletek: január 18-a 15,3 °C-kal, március 17-e 22,9 °C-kal, június 11-e 34,1 °C-kal, október 10-e 26,1 °C-kal, november 5-e 21,7 °C-kal és december 13-a 14,4 °C-kal, szilveszter reggel viszont -14 °C-ra hűlt le a levegő. Február (148,6 mm), július (104 mm), augusztus (160,1 mm) és szeptember (204,5 mm) volt a legcsapadékosabb, március (18,1 mm) pedig a legszárazabb hónap. Február 11-től 13-ig 56 mm, augusztus 13-tól 14-ig 51 mm, augusztus 31-től szeptember 3-ig 75 mm, szeptember 9-től 12-ig 87,9 mm, szeptember 21-én 46,9 mm és október 21-től 24-ig 86,2 mm csapadék hullott. Az éves maximumot, 52,4 mm-t október 21-én mérte az automata.

2015. 11,3 °C 606,2 mm

Az előző csapadékos év után egy szárazabb, meleg év következett, melynek október kivételével (9,6 °C) minden havában átlagon felüli középhőmérsékletek voltak. Ebből január (2,7 °C), július (22,7 °C), augusztus (21,9 °C), november (6,1 °C) és december (2,2 °C) emelkedik ki leginkább. Január 16-án 14,8 °C, április 16-án 27 °C, július 22-én 35,6 °C, augusztus 13-án 36,1 °C, szeptember 1-én 32,6 °C és november 11-én 23,6 °C maximum-hőmérsékletet mért az automata. November 8 és 12 között egy kivétellel minden nap meghaladta a 20 °C-ot a hőmérséklet. A leghidegebb január 1-én

(-13,6 °C) és február 8-án (-12,1 °C) volt. Az év során csak 5 téli, 2 zord és ami érdekes, hogy a forró nyár (21,3 °C) ellenére csak 79 nyári napot rögzíthettünk. Júliusban 10 nap volt 25 °C feletti átlaghőmérséklet 19 hőség és 3 forró nappal, augusztusban pedig 5, 16 hőség és szintén 3 forró nappal. A legszárazabb hónapok: a szeles április 9,7 és december 2,7 mm-rel, a legcsapadékosabb pedig május volt 142,4 mm-rel. A május 20-22 között átvonuló hidegfrontból 81,1 mm eső, záporosó esett – a legtöbb 22-én, 41,6 mm. A július 8-i zivatar 83 km/h-ás maximális széllel vonult át felettünk és az augusztus 16-17-i Balatonmáriát sújtó kb. 3 havi csapadékmennyiségű özvénzből (Balatonkeresztúr 109,4 mm) szerencsére Nagykanizsának csak egy jó öntözésnyi (11,1 mm) jutott.

2016. 10,8 °C 736,9 mm

Az átlagosnál kissé melegebb év főbb jellemzői: a nagyon enyhe és csapadékos február, a változékony nyár kissé hűvösebb augusztussal és a 2001 óta nem tapasztalt hideg, száraz december. Január a hónapra jellemző hideggel kezdődött. 5-én volt az év legalacsonyabb hőmérséklete, -12,9 °C. A hónap folyamán a minimum-hőmérséklet 13 napon volt alacsonyabb -5 °C-nál és 4 napon -10 °C-nál, ellenben 2 napon a maximum-hőmérséklet meghaladta a 15 °C-ot. Ez a már év elején megjelenő zivataroknak volt köszönhető, mely először a január 13-án érkező hidegfront során alakult ki. Február 5,9 °C-os, enyhe átlaghőmérsékletével, rendkívüli, 117,7 mm csapadékmennyiségével, valamint 5 50 km/h-s szélerősséget meghaladó viharos napjával tavaszi hónapot könyvelhettünk el. A hónap folyamán 17 csapadékos nap volt. Zivatar 3-án 20,1 mm záporosóval, 68 km/h-s széllal és 10-én 13 mm-rel. A 12 – 15-ig lehullott csapadék-mennyiség 48,4 mm volt. A korán beköszöntött tavasznak és az április 1 – 23-ig tartó 20 °C feletti maximum-hőmérsékletnek tragikus következményei lettek. Az április 24-én 84 km/h-s széllal betört hidegfrontot 26-án -2,7 °C-os fagy követte, melynek következtében a dió, a szőlő és helyenként az akác, szinte teljesen elfagytak. Június kellemesen meleg volt. Minden nap 20 °C fölé kúszott a hőmérő higanyszála, csupán 3 nap volt 30 °C feletti hőmérséklet 24-én az évi maximummal, 33,8 °C-kal. A 19-i zivatarból 21,2 mm záporosó esett. Júliust, de főként augusztust meleg és hűvös időszakok váltogatták. 5 viharos napja ellenére július volt a melegebb, csak 15- és 16-án maradt 20 °C alatt a maximum-hőmérséklet. Július 13-a időjárása beírta magát a balatoni vitorlás-történetbe. A Kék Szalag vitorlásversenyt megelőző éjszaka erős hidegfront érkezett, mely Balatonfüred térségében hatalmas viharrá, supercellává erősödött, az induló hajók jelentős részét megrongálva, összetörve. Ebből a zivatarból Nagykanizsán 29,6 mm záporosó esett, 16-án pedig 13,6 mm. Augusztus átlaghőmérséklete 20 nyári napja ellenére csak 19,1 °C volt, mely az átvonuló hidegfrontoknak tudható be. Jelentősebb zivatarok voltak: a 10-i 14,6 mm csapadékkal, a 15 – 16-i 28,6 mm-rel és a 19-i 21,7 mm-rel. Az augusztusban elmaradt nyári napokat szeptember kárpótolta. A hónapban csak négyszer maradt 20 °C alatt a maximum-hőmérséklet 16-ig 30 °C közeli hőmérsékletekkel. Október volt a második legcsapadékosabb hónap 105,3 mm-rel. 10-én 20,8 mm eső, a 15-i zivatarból 16,7 mm záporosó, 23-án, az év legcsapadékosabb napján pedig 43 mm eső-záporosó esett. A városon a 4-i hidegfront 72 km/h-s viharos széllal vonult át. Az évet a már megszokottól eltérően hideg, -1,3 °C-os decemberrel zártuk. 23 nap volt negatív az átlaghőmérséklet és 9 nap a maximum is 0 °C alatt maradt. A minimum-hőmérséklet 30 napon át volt kisebb, vagy egyenlő 0 °C-nál 11 hideg és 1 zord nappal. Mindössze 4 csapadékos nap volt 7,3 mm-rel. A hónap érdekessége még, hogy 6-án reggel az erősen zúzmarás városnak csak a keleti felén havazott.

2017. 11,1 °C 679,9 mm

Egy rendkívül hideg januárral kezdődő meleg, szárazabb, viharos és szélsőséges évet élhettünk meg. A globális felmelegedést a feldolgozott időszak második legmagasabb hőmérséklete, 38,6 °C, a harmadik helyezett 21,9 °C-os nyári átlaghőmérséklet és 8 forró nap igazolja. 1993 óta a

legszelesebb, 1994 óta pedig a legviharosabb év volt 123 szeles és 34 viharos nappal. (Lásd: Ha a szellőkések elérik, vagy meghaladják a 10 ill. 15 m/s-ot.) Viharos szél minden hónapban előfordult, melyből 7-ben a 70 km/h-t is meghaladták a szellőkések. 1985 óta nem volt ilyen hideg január (-5,3 °C). Két nap kivételével az átlaghőmérséklet mindig negatív volt, 11-én az év leghidegebb napján -10,3 °C. Aznap a hőmérséklet -16,9 °C-ig süllyedt. Az 5-én érkező hidegfront szellőkészei 77 km/h-s sebességet értek el és a szélvihar csak 7-én reggelre gyengült. A 13-án reggel kezdődő eső havazásra váltott 20 mm csapadékot eredményezve. A hidegnek köszönhetően a hótakaró február 3-ig maradt meg. Januárban 21 téli és 10 zord napot könnyelhetünk el és 26 nap volt -5 °C alatti hőmérséklet. A 2016–17-es tél ismérve, hogy november 28-tól február 2-ig a minimum-hőmérséklet december 28-a kivételével mindig 0 °C alatt maradt. A fagyos januárt a február 3-i 51 km/h-s enyhe D-DNy-i szél és a 4–6-ig leesett 34,3 mm eső oldotta fel. Februárban annak ellenére, hogy 7 nap negatív volt az átlaghőmérséklet, a hó végi kora tavaszi időszaknak köszönhetően ez 3,6 °C-ra emelkedett. A hónap folyamán az átlagnál több, 66,8 mm eső esett. Az év legszárazabb hava március volt 8,6 mm csapadékmennyiséggel. A hónapban 10 nap fagypontra süllyedt a minimum-hőmérséklet, az átlaghőmérséklete mégis magas, 8,5 °C volt. Április az előző hónaphoz hasonlóan száraz volt 20,9 mm csapadékkal, de ez a hónap nem erről hírhedt. 1-én 23,7 °C, 2-án 23,8 °C és 3-án 24,1 °C volt a maximum-hőmérséklet, melynek hatására felgyorsult a rügyfakadás, hajtásnövekedés. 19-én és 20-án 70 km-t meghaladó szellőkésekkel tört be egy hidegfront, mely nálunk nem, de Bánkúton 87 cm-es, a magasabban fekvő ország részben pedig 50 cm-es hóréteget hagyott maga után. 21-én reggelre -2,1 °C-ra süllyedt a hőmérséklet, jelentős kárt okozva a kultúrnövényekben. Május szintén szárazabb volt az átlagosnál (39 mm), így a tavaszi hónapokban csak 68,5 mm eső, záporosó esett. 10-én volt a legalacsonyabb (0,2 °C) és 31-én a legmagasabb (29,9 °C) hőmérséklet. A szárazság júniusban is folytatódott, melyet fokozott a május végétől kezdődő hőség. Június átlaghőmérséklete 21,3 °C 26 nyári, 9 hőség és 2 forró nappal. 22-én volt a legmelegebb, 35,5 °C. A 25-i zivatarból 17,5 mm záporosó esett. Júliusban a szárazság nem, viszont a hőség fokozódott. A hónap átlaga 22,1 °C volt 27 nyári, 14 hőség és 2 forró nappal. 7-én volt a havi maximum-hőmérséklet, 35,2 °C, melyet 19,1 mm záporosó enyhített. 11-én egy jégesővel kísért nagy erejű zivatar söpört végig a városon a Csónakázó-tótól az Ady út vasútállomás felé eső szakaszáig szűk sávban. A meteorológiai állomáson az automata 70,6 km/h-s szellőkést mért, de a kidöntött, kettétört fákat és megrongált háztetőket nézve sokkal nagyobb szélerősség lehetett az említett sávban. A zivatarból és a másnapi záporból 36,3 mm jégeső, záporosó esett. Mivel a havi csapadékösszeg (78,1 mm) zöme 4 nap alatt hullott le, csak kis mértékben enyhítette a szárazságot. Ebben az évben augusztus volt a legmelegebb hónap 22,2 °C-os átlaggal, 28 nyári, 17 hőség és 4 forró nappal. 1–5-ig az átlaghőmérséklet meghaladta a 25 °C-ot és ebből három egymást követő napon a 27 °C-t is elérte. 4-én 38,6 °C volt a maximum-hőmérséklet, mely az év legmagasabb értéke és egyben az abszolút második helyezett. 10-én este 97,2 km/h-s szélerősséggel újabb zivatargóc érte el a várost. Ezen a napon Sopronban 137,2 km/h-s szellőkést mértek. A Dunántúl jelentős részén tűzoltók százai dolgoztak a károk helyreállításán. A város repülőterén ekkor rendezték a 14. Ultrakönnyű-repülők Európa-bajnokságát és a légi-járművekben keletkezett károk és a rossz idő miatt a versenyt két nappal elhalasztották. 19-én 11,3 mm záporosó esett, majd a 27-én 69 km/h-s széllel érkező zivatarból 6,5 mm. A hőség és a 4 nap alatt leesett kevés (23,7 mm) csapadék miatt fokozódott a szárazság, melyhez a viharos szelek párologtató hatása is nagymértékben hozzájárult. A nyári hónapok csapadékösszege (151,3 mm) 86,2 mm-rel maradt el az átlagtól, aztán szeptemberben végre megnyíltak az ég csatornái. A 16 csapadékos napon 146,3 mm eső, záporosó esett. A legtöbb 14-től 20-ig, 110,4 mm. A vénasszonyok nyara október 11-e és 20-a közé esett. A hőmérséklet minden nap meghaladta a 20 °C-ot, majd ezt követően, 22, 23-án 46,6 mm eső esett. Október sem maradt viharok nélkül. 24-én és 27-én 78,5 ill. 77 km/h-s szélvihar söpört végig a városon és ez novemberben és decemberben is megismétlődött. November 13-án és 14-én 67 ill. 57 km/h-s szellőkések voltak. 22-én és 23-án 16 °C fölé emelkedett a hőmérséklet, ellenben 28-án -6 °C-ra süllyedt. Csapadékos napok voltak: 12-e 16,8 mm-rel, 25-e 21,4 mm-rel és 29-e 23,6 mm-rel. Az év végére lassan helyreállt a talaj nedvességtartalma. Decemberben 12 csapadékos nap volt 93,6 mm csapadékösszeggel. 5-én reggelre 1-2 cm-es hó hullott. Az év

legcsapadékosabb napján, 12-én 16,7 °C-os, 72,7 km/h-s déli szelet követően 32,6 mm eső és a 28-i zivatarból pedig 22,3 mm záporosó esett. A hónap átlaghőmérséklete átlagosnál enyhébb, 2,8 °C volt. 10 nap volt 10 °C-nál magasabb hőmérséklet és 21 nap 0 °C alatti, 4-én a legalacsonyabb, -6,7°C.

2018. 11,5 ° 699,1 mm

118 év országos évi középhőmérsékletét nézve a legmelegebb év, 11,99 °C-kal. Nagykanizsa évi átlaghőmérséklete – 110 évre visszamenőleg – „csak” harmadik helyezett lett. Február és március kivételével minden hónap melegebb volt az átlagosnál. A meleg év ellenére forró napot nem jegyezhetünk fel. 24 hőség és 113 (4. helyezett) nyári nap volt, zord, hideg, ill. téli nap viszont kevés. A legmagasabb hőmérséklet augusztus 9-én, 33,4 °C volt, a legalacsonyabb pedig március 1-én, -19,2 °C. Az évi csapadékmennyiség a 110 éves átlagtól kissé elmaradt.

Január átlaghőmérséklete (4,0 °C) csaknem 5 °C-kal haladta meg az átlagosat. A téli hónap ellenére 15 napon nem volt negatív hőmérséklet. A napi átlaghőmérséklet is csak 15-én volt negatív, -1,5 °C, 6-án pedig rendkívül enyhe, 10,9 °C.

Az enyhe január után hideg február következett -0,6 °C-os átlaggal. Az utolsó négy nap volt a leghidegebb, 28-án -10,6 °C-os átlaghőmérséklettel. A hónaphoz képest sok, 70,5 mm csapadék hullott. Míg januárban csak 2 nap havazott, februárban 9 nap. A 23-án és 24-én lehullott hó vastagsága meghaladta a 10 cm-t.

Március volt az év legcsapadékosabb hava 109,6 mm-rel, ami a hónap átlagának két és félszerese. 17-én és 31-én esett a legtöbb, 28,3 ill. 25,5 mm. 2-án és 5-én ónos eső esett és 6 nap havazott. A hónap első öt napján negatív volt az átlaghőmérséklet, 1-én, az év leghidegebb napján -10,9 °C. Az aznapi minimumhőmérséklet -19,2 °C volt. Március 7-től viszont gyors felmelegedés kezdődött 11-, 12- és 13-án 17 – 17,2 °C-os maximumhőmérsékletekkel.

Április száraz, az átlag felénél kevesebb, 21,8 mm csapadékkal és az átlagnál több mint 4 °C-kal melegebb, 14,7 °C-os volt. A fagyok is elmaradtak. A hónapban 8 nyári nap, 3-án és 9-én pedig viharos déli szél volt.

Május 15 nyári napjával szintén melegebb volt az átlagosnál (18 °C) kevés, 48,2 mm csapadékkal. Mindössze 5 nap esett számottevő eső, záporosó.

Június 20 nyári napján mindössze háromszor volt 30 °C feletti maximumhőmérséklet. Heti rendszerességgel érkeztek a hidegfrontok. Az 5-én du. jéggel, felhőszakadással érkező zivatar az alacsonyabban fekvő városrészeket 20-30 cm-es vízzel árasztotta el. A Meteorológiai Állomás 23,2 mm csapadékot mért, de a város ennél jóval többet kaphatott.

Júliusban 27 nyári és 4 hőségnap volt, melyből 3 a hónap végén volt. 6-án 21,2 mm, 10-én 21,6 mm és 21-, 22-én 38,8 mm eső, záporosó esett.

Augusztusban, a legmelegebb hónapban (21,7 °C) 24-ig 20 °C feletti átlaghőmérséklet volt. A hónap 28 nyári napján 17 hőségnap volt, 9-én a legmagasabb, 33,4 °C-os hőmérséklettel. 3 nap, 10-én, (27,5 mm), 14-én (15 mm) és 25-én (13,6 mm) esett jelentősebb csapadék, 14-én viharos északi széllel.

Szeptember átlagosnál csapadékosabb volt (94,2 mm) 15 nyári nappal. 1–4-ig 69,9 mm, 23-án pedig 17,4 mm eső, záporosó esett. 22-én viharos É – ÉK-i szél fújt és 27-én és 30-án reggel fagyott. A csapadékos szeptembert 3 száraz hónap követte.

Október rendkívül száraz volt, mivel a havi 30,2 mm csapadékból (ami az átlagos havi csapadékmennyiség harmada) 28,2 mm egy napon, 28-án esett. Csak elsején reggel volt fagy, a hónap végén viszont 20 °C feletti maximumhőmérsékleteket mért az automata.

November szintén száraz volt (41 mm), csak 25-, 26-án volt jelentősebb csapadék, 24,3 mm. 2-án és 12-én 20,5 °C és 20,0 °C volt a maximumhőmérséklet. Csak a hónap utolsó három napjának átlaghőmérséklete volt negatív, 29-én -8,3 °C-os és 30-án -8,4 °C-os minimumhőmérsékletekkel. A tél első hava 19-én hullott le.

December volt az év legszárazabb hónapja 11,4 mm-rel. Ez a havi átlagmennyiség ötöde. A 4 téli

napból 18-án volt legalacsonyabb a minimumhőmérséklet, $-6,9\text{ }^{\circ}\text{C}$, három napon viszont a maximumhőmérséklet meghaladta a $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ot.

Végszó

Utazásaim során gyakran mesélnek útitársaim pozitív, vagy negatív életeseményükhöz kapcsolódó rendkívüli időjárási viszonyokról. Sok esetben ezt akkori szubjektív élményeik miatt tévesen ítélik meg. Egy másik érdekesség, hogy a múltbéli történések feledésbe merülnek és az éppen aktuális időjárási eseményt tüntetik fel rekordértékűnek.

Írásom nem teljes, hisz csak a kiemelkedő eseményeket tárja fel, több meteorológiai érték is hiányzik belőle. Mégis úgy gondolom, hogy a feltüntetett adatok, ha kis mértékben is, de reális képet adnak a múlt fontos időjárási eseményeiről. Ugyan nem tartalmaz elemzést, összegzést, de az olvasónak támpontot ad a folyamatok, mint pld. a klímaváltozás megfigyeléséhez. Hogyha a tanulmányt folyamatában olvassuk, bizony eléggé kaotikusnak tűnik egyes évek közti lényeges különbségek miatt, de ha összehasonlítunk pár évtizedeket felölelő adatsort, érzékelhető változásokat figyelhetünk meg. Mindezt az olvasó fantáziájára bízom.

Nagykanizsa, 2015. október 17.